

die im Darmkanale des menschlichen Körpers
vorkommenden
Helminthen.

Inaugural - Dissertation

welche

mit Erlaubniss der Hohen Medicinischen Facultät der
Universität Greifswald

nach

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

veröffentlicht

der Verfasser

Dr. Hermann Rielaender.

Greifswald.

druck der Königl. Universitäts - Buchdruckerei von F. W. Kunike.
1868.

Seinem Onkel

dem

Pastor ***Hermann Rielaender***

zu

Wewelsburg

gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Ueber
**die im Darmkanale des Menschen lebenden
Helminthen.**

Die Frage über die Entstehung der Eingeweidewürmer ist von jeher, Aerzten sowohl, wie Naturforschern von Interesse gewesen und hat zu den verschiedensten Hypothesen Veranlassung gegeben. Denn, so bekannt die Entstehungsweise der Ectoparasiten dem Naturforscher schon lange war, so wenig wusste man bis in die neuere Zeit von der Entstehung der im Innern des Leibes lebenden Schmarotzerthiere und insbesondere der Eingeweidewürmer. Es war nur eine doppelte Möglichkeit ihrer Entstehung vorhanden; sie mussten entweder im Innern des Körpers, durch generatio aequivoca entstehen, oder sie mussten auf irgend eine Weise von Aussen eingewandert sein. So lange man bei den Thieren, besonders den niedriger organisirten Thieren, an eine generatio aequivoca glaubte, suchte man sich begreiflicherweise auch die Entstehung der Helminthen auf diese Weise zu erklären und war höchstens über die Beschaffenheit des Materiales, welches sich zu denselben gestalten

sollte, verschiedener Ansicht. Bald nahm man das Blut und die Säfte, bald die Absonderungen des Darmkanals, bald die genossenen Speisen als Substrat der Uerzeugung in Anspruch, nur dass man sich vielleicht darüber stritt, ob der erste Anstoss zur Erzeugung von einer Fäulniss, einer Gährung, oder einem organisirenden Prinzip ausgehe. Erst als im 17. Jahrhundert Swammerdam und Redi nachwiesen, dass die geschlechtliche Fortpflanzung nicht allein auf die höheren Thiere beschränkt sei, wie sie das denn besonders für die Insekten nachwiesen, erst da trat eine Reform in der Zeugungslehre, sowohl im Allgemeinen, als auch insbesondere für die Entozoen ein. Und wenn diese Forscher auch über die Entstehung der Eingeweidewürmer ein Urtheil nicht zu fällen wagten, die Ansicht von der Heterogenie derselben gewann doch immer festern Boden, je mehr die Entstehungsweise durch Fortpflanzung bei den Thieren in immer weiteren Kreisen und immer bestimmter als einzige Fortpflanzungsart nachgewiesen wurde; je mehr auch die Einführung des Mikroskops bei wissenschaftlichen Untersuchungen eine neue Welt kleiner Geschöpfe enthüllte. Nur verfiel man jetzt, durch letztere Entdeckung bewogen, in einen neuen Irrthum und leitete die Entozoen von Thieren ab, die für gewöhnlich unter abweichender Form im Freien existirten (Boerhave, Hoffmann), wie die Infusorien, oder auch von grösseren Thieren, meist freilebenden Würmern, und besonders solchen, die einige Verwandtschaft in ihrem Aeussern mit den Entozoen zur Schau trugen. Doch, die selbstständige Natur der Entozoen sollte nicht lange unbekannt bleiben. Man

überzeugte sich nicht nur davon, dass die Annahme einer zufälligen Umwandlung von frei lebenden Thieren in Eingeweidewürmer den Erscheinungen der Fortpflanzung widersprächen, sondern lernte sie auch als geschlechtsreife Thiere, als Vertreter einer eignen Art kennen.

Doch, diese Würmer schienen nicht allein im Darme vorzukommen, man glaubte auch, getäuscht durch die Aehnlichkeit mit gewissen frei lebenden Würmern, dieselben im Freien vorgefunden zu haben, und zwar ging diese Ansicht vorzüglich von Linné aus. Derselbe fand nämlich einen jungen Bandwurm, einen *Bothriocephalus solidus*, wie wir jetzt wissen, welchen er unbedenklich für einen *Bothriocephalus latus* hielt. Je mehr aber die Zahl der Eingeweidewürmer durch neue Entdeckungen bereichert wurde, desto unwahrscheinlicher wurde die Behauptung Linné's, denn aller Bemühungen ungeachtet konnte man die, jetzt besser bekannten, Schmarotzer nicht im Freien auffinden. Pallas sprach zuerst die Behauptung aus, dass die Entozoen von ihres Gleichen abstammten, und aus Eiern entständen, die von einem Wirthe auf einen andern übertragen würden, und zwar durch Speisen und Getränke. Das Vorkommen im Gehirn und in andern Organen suchte er sich dadurch zu erklären, dass er annahm, die Eier treten vom Darme aus in das Gefässsystem über und würden so in die sonst unzugänglichen Organe übergeführt. Auf solche Weise konnten denn auch die Eier auf den Embryo übergehen, die Eingeweidewürmer also vererbt werden. Trotz verschiedener Versuche, die Einwanderung von Aussen zu beweisen, konnte Pallas zu keinem befriedigenden Re-

sultate gelangen, und so konnte es denn kommen, dass Rudolphi und Bremser die halb vergessene Lehre von der Uerzeugung wieder aufgriffen und durch das Gewicht ihres Ansehens die gegenüberstehenden Ansichten Brera's und Anderer erdrückten. Das Mikroskop, eine Zeit lang fast vergessen, jetzt aber wiederum für die wissenschaftlichen Untersuchungen dienstbar gemacht, sollte bald überraschende Entdeckungen herbeiführen. Mehlis entdeckte 1831, dass die Eier gewisser Distomeen einen Embryo enthielten, der durch Gestalt und Flimmerung einem Infusorium ähnele und, nach dem Verlassen des Eies, auch wie ein solches umherschwimme, welche Angabe von Nordmann bestätigt und dahin ausgelegt wurde, dass jene Schmarotzer „während ihrer ersten Lebensperiode das Wasser zu ihrem eigentlichen und natürlichen Aufenthalte haben und erst später in den Leib ihrer Wirthe gelangen, um nun, nachdem das Organ für Lichtempfindung ihnen entbehrlich geworden, ihr Geschlecht fortzupflanzen.“ Bald darauf publicirte Siebold die merkwürdige Beobachtung, dass die Embryonen des *Monostomum mutabile* in ihrem Innern einen „nothwendigen“ Schmarotzer beherbergten, der so auffallend dem unter dem Namen der „königsgelben Würmer“ der Teichhornschnecke beschriebenen Parasiten gleiche, „dass man fast auf die Idee gerathen möchte, ob diese Körper, die nach dem Untergange ihres lebenden Kerkers noch fortlebten, nicht vielleicht zu denselben heranwüchsen.“ Auch entdeckte derselbe, dass die Bandwurmeier meist schon vor dem Ablegen einen Embryo enthielten, der von dem späteren Bandwurm sehr verschieden war, so

dass kein Zweifel blieb, dass die Embryonen nur durch eine Art von Metamorphose in ihren definitiven Zustand übergehen könnten. Erst Steenstrup gelang es nachzuweisen, was schon von Eschricht und Valentin ausgesprochen war, dass es Thierarten giebt, deren Nachkommen erst in zweiter und dritter Generation zu der ursprünglichen Form der Geschlechtsthiere zurückkehren, und dass zu diesen Thierarten zahlreiche Eingeweidewürmer gehören. Er trug auch, durch seine Entdeckung geleitet, kein Bedenken, den geschlechtslosen Binnenwurm und namentlich die Blasenwürmer für Zwischengenerationen zu erklären, sie als Ammen in Anspruch zu nehmen, wobei er auf die Wanderung der Embryonen grosses Gewicht legte und die Ueberzeugung aussprach, dass die Eingeweidewürmer nur zu gewissen Zeiten schmarozten, zu andern, vielleicht in andern Stadien und Generationen frei lebten, eine Ansicht, die alsbald durch Dujardin's und Siebold's Entdeckungen seine Bestätigung fand. Siebold suchte jetzt auch, durch verschiedene Beobachtungen bei den in oceanischen Fischen so häufig gefundenen Tetrarhynchen geleitet, zu beweisen, dass die eingekapselten Köpfe derselben aus Embryonen hervorgingen und erst bei Uebertragung in einen andern Wirth sich zu geschlechtsreifen Bandwürmern entwickelten und seine Ansicht fand durch die Beobachtungen und Untersuchungen van Beneden's alsbald seine Bestätigung. Erst Küchenmeister aber war es vorbehalten, durch Fütterungsversuche den direkten Nachweis zu liefern und den ganzen Cyclus der Lebensgeschichte des Bandwurms uns klar vor Augen zu legen. Jetzt drängten sich wahrhaft die

Entdeckungen, und wenn auch die Lebensgeschichte vieler Eingeweidewürmer noch in manchem Punkte dunkel ist, so können wir doch der festen Ueberzeugung sein, dass im Laufe der Zeit manches Dunkel sich aufhellen, dass dem Arzte das Material für eine wirksamere Prophylaxis geliefert werden wird.

Die im Darmkanale des Menschen schmarotzenden Würmer gehören zwei Klassen an, es sind Platyhelminthia und Nematelminthia, Plattwürmer und Rundwürmer. Die Platyhelminthia oder Plathelmen zerfallen in vier Unterabtheilungen, die Turbellarien, Cestoden, Trematoden und Hirudineen, von denen uns jedoch nur die Cestoden interessiren; ebenso zerfallen die Nematelminthia in die Acanthocephalen, Nematoden, Chaetognathen und Chaetopoden, wovon jedoch nur die Nematoden im menschlichen Darms vertreten sind.

Die menschlichen Cestoden theilen sich wieder in zwei Familien, die Taeniaden und Bothriocephalen.

Von der Familie der Taeniaden beherbergt der Mensch häufiger die *Taenia solium* und die *Taenia mediocanellata* und gelegentlich auch die *Taenia nana* die *Taenia flavopunctata* und *Taenia elliptica*.

Die *Taenia solium* gehört, wie überhaupt die Cestoden zu den parenchymatösen Thieren: es fehlt eine Eingeweidehöhle, sie athmet durch die Haut und nimmt auch durch dieselbe die Nahrung auf. Die *Taenia solium* ist nicht ein einfaches Thier, sondern vielmehr eine Thierkolonie, welche an einer Amme, dem sogenannten Kopfe entsteht. Die Grösse der Taenie im ausgewachsenen Zustande beträgt 2 — 3 Mtr. und ihre Ge-

schlechtsthier, Proglottiden, sind im reifen Zustande von 9—10^{mm} Länge und 6—7^{mm} Breite. Der Kopf ist von der Grösse eines Stecknadelpf, rundlich-birnförmig; sein Scheitel ist im vorgestreckten Zustande flach gewölbt und mit einem kleinen linsenförmigen Rostellum (0,36^{mm}) und 4 becherförmigen Saugnäpfen (0,4^{mm}) versehen, welche letztere eine kräftige Muskulatur besitzen und dem Kopfe ein viereckiges Aussehen geben. Dadurch, dass sie einander paarweise genähert sind, geben sie dem Kopfe ein zusammengedrücktes Ansehen. Vom vorderen Rande der Saugnäpfe hängt frei in den halbkugelförmigen Innenraum ein Diaphragma, welches von Radial- und Zirkelfasern durchsetzt ist und jedenfalls dazu dient, beim Ansaugen ein inniges Anschmiegen mit möglichst grosser Berührungsfläche zu vermitteln. Die Wand des Rostellum hat dicht verwebte Muskelfasern, welche theils radiär, theils cirkelförmig verlaufen, sodass durch seine Contractionszustände der Scheitel entweder hervorgewölbt, oder eingezogen wird. Auf dem Rande des Rostellum steht ein doppelter Hakenkranz, der aus zweierlei Haken, grösseren und kleineren besteht, deren Spitzen nahezu in dieselbe Kreislinie fallen. Der Drehpunkt der kleineren Haken liegt etwas weiter nach Aussen. Der Hauptunterschied beider Hakenformen, welche im Uebrigen in gleicher Anzahl vorhanden sind und deren Gesamtzahl von 24—28 variirt, besteht in der Länge der hintern Wurzelfortsätze, welche sich wie 3:2 verhalten. Ausserdem ist der vordere Wurzelfortsatz der kleineren Haken am Ende breiter, als der der grossen, die Krallen etwas kürzer, schlanker an der Basis und

stärker gekrümmt. Die Wurzeln stecken in eigenen Hakenaschen, wie das auch bei den anderen bewaffneten Taenien der Fall ist. Küchenmeister hielt dieselben für der *Taenia solium* eigenthümlich und nannte sie deshalb *Taenia hamoloculata*. (Die in und am Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten. S. 65.) Auf den Kopf folgt ein schmaler Hals von fast 1 Zoll Länge, dessen Gliederung man mit unbewaffnetem Auge nicht erkennen kann. Hinter ihm beginnt der gegliederte Taenienkörper, dessen Glieder, Anfangs nur kurz und breiter, als lang, allmählig an Länge wachsen, sodass sie am Ende des ersten Mtr. eine quadratische Form annehmen und ihre Länge, in weiterer Entfernung vom Kopfe, die Breite mehr und mehr überwiegt. (Leuckart, die menschlichen Parasiten und die von ihnen herrührenden Krankheiten, p. 252 ff.) Mit dem 450. Gliede ist die geschlechtliche Entwicklung vollendet und 130^{cm} hinter dem Kopfe beginnt die Reife der Glieder.

Das Körperparenchym zerfällt in zwei neben einander liegende Hauptschichten, eine periphere Rindenschicht und eine centrale Mittelschicht. Die Grundsubstanz beider Schichten besteht aus dicht gedrängten hellen Kernzellen, welche durch eine Zwischensubstanz eng verbunden sind. Die Mittelschicht enthält die Geschlechtsorgane und die excretorischen Gefässe; die Rindenschicht ist wesensentlich muskulös und enthält eine mässige Menge Kalkkörperchen, welche auch in der Mittelschicht, doch hier nur vereinzelt vorkommen. Die grösseren betragen 0,012^{mm}. Die Oberfläche der Rindenschicht wird von einer derben, chitinigen Cuticula be-

kleidet, unter welche eine körnerreiche Parenchymschicht sich verbreitet. Cuticula, Rinden- und Mittelschicht gehen an der Verbindungsstelle der einzelnen Glieder ununterbrochen in einander über und die Furche an dieser Stelle ist nur eine Falte der Aussendecke. Je näher das Glied dem Termine seiner Ablösung rückt, desto tiefer wird diese Falte, während zugleich in der Mittelschicht zwischen beiden Gliedern eine sich allmählich verbreitende Querspalte entsteht, bis zuletzt durch die Rindenschicht allein der Zusammenhang vermittelt wird, durch Muskelfasern also, welche, bei einer kräftigen Contraction an dieser Stelle, leicht zerreißen. Die Muskulatur besteht aus dicht zusammengruppirten glatten Fasern mit dreifach verschiedenem Verlauf, aus Längsfasern, welche die mächtigste Schicht bilden, aus Radiärfasern und aus Ringfasern. Zwischen den Flächen der Mittelschicht sieht man ausserdem ein System horizontaler Fasern sich ausspannen, die hier und da zur Aufnahme der Geschlechtsorgane auseinander weichen. Ein Nervensystem ist bei den Cestoden bis jetzt noch nicht aufgefunden; in gleicher Weise fehlt auch ein Darmkanal und ein Blutgefässsystem. Mächtig entwickelt ist dagegen der excretorische Apparat, das Wassergefässsystem Siebold's. Gewöhnlich findet man bei den Cestoden 4 Stämme, welche sich kurz hinter den Saugnäpfen aus den Kapillaren des Kopfes entwickeln, durch ein gemeinsames Gefäss am Kopfe verbunden sind, und, zu je zwei und zwei in den Seitentheilen der Mittelschicht gelegen, vom Kopf bis zum letzten Gliede verlaufen. Aus ihnen entspringen wieder dünnere Kanäle, welche sich nach kurzem Verlaufe baumartig in

der Rindenschicht verästeln, häufig communiciren und an ihren Spaltungsstellen kleine, beständig flackernde Wimperläppchen haben. Am hinteren Ende eines Gliedes hängen die 4 Gefässe durch eine Ringanastomose zusammen, welche, je mehr die Glieder sich dem Ende nähern, immer enger und enger wird, bis im letzten Gliede statt ihrer eine einfache Blase erscheint, die Ausmündungsstelle. Ausser im letzten Gliede haben die Gefässe noch Ausmündungsstellen hinter den Saugnäpfen. Eine eigene Muskulatur besitzen die Gefässe nicht, sodass die Bewegung der Flüssigkeit durch die Wimperläppchen und die Körpercontraktionen bewirkt werden muss. Die Flüssigkeit, welche die Gefässe enthalten, ist wasserhell und enthält bisweilen kleine Körperchen mit starkem Lichtbrechungsvermögen. Ihre chemische Beschaffenheit ist unbekannt, doch vermuthet man, dass die Kanäle, nach Analogie mit den ähnlichen Einrichtungen der Trematoden als Harnapparat fungiren (Leuckart, l. c. I. p. 173.) Bei der *Taenia solium* sind, wenigstens in den grösseren Gliedern, nur zwei Längsstämme, aber diese von ansehnlichem Lumen, aufzufinden. Die Geschlechtsorgane sind, wie das überhaupt bei den Cestoden der Fall ist, nur in den Gliedern vorhanden, und zwar trifft man in jedem Gliede männliche und weibliche Organe, welche jedoch, obgleich dicht neben einander und durch einander gelagert, nirgend in unmittelbarem Zusammenhange mit einander stehen. Die männliche und weibliche Genitalöffnung liegen dicht neben einander in der Mitte des scharfen Randes der Glieder und zwar meistens alternirend bald auf der rechten, bald auf der linken

Seite. Die männliche Oeffnung liegt über der weiblichen und beide münden in einen gemeinsamen Porus genitalis aus, in eine im Umkreise beider Geschlechtsöffnungen entwickelten, von einem wulstigen Ringwalle umgebenen Grube. Der männliche Geschlechtsapparat besteht aus Hoden, Samenleiter und Begattungsorgane, Cirrus. Der Cirrus ist von unbedeutender Länge und eigentlich nur das dickere, muskulöse Ende des Samenleiters, welches im Ruhezustande im Innern einer muskulösen Kapsel, dem Cirrusbeutel, geschlängelt liegt, und durch Contraction des letzteren hervorgestreckt wird. Am inneren Ende des Cirrusbeutels verdünnt sich der Samenleiter, läuft gewunden in der Mittellinie des Gliedes bis zum Uterus und löst sich hier wirbelförmig in eine Anzahl dünner Kanäle auf, welche sich, vielfach verästelt, durch die ganze Mittelschicht, besonders in deren oberer Hälfte verbreiten und an ihrem Ende helle Bläschen von 0,12—0,15^{mm}, die Hoden tragen. (Leuckart, l. c. I, p. 262 ff.)
In den Hoden trifft man, je nach dem Entwicklungsgrade der Glieder, bald dünne fadenförmige Spermatozoen, bald deren Entwicklungskerne, helle Kugeln, die an der Peripherie in grösserer oder geringerer Ausdehnung mit kleinen Bläschen besetzt sind, welche im Laufe der Zeit zu Samenfäden auswachsen.

Die Vagina verläuft eine Strecke weit parallel mit dem Samenstrange, biegt dann aber im Bogen nach abwärts zum hintern Theile des Uterus. An ihrem hintern Ende schwillt sie zur Samenblase an (0,07 — 0,1^{mm}). Ihre jetzt folgende Fortsetzung ist weiter, als der übrige Kanal und endet in einen kuglichen Körper; letzterer

wird Befruchtungskanal (Leuckart) genannt, hat 0,2^{mm} Durchmesser, eine zellige Textur und dicke Wandungen. Er steht mit dem Uterus und den keimtreibenden Organen in Communication und bekommen in ihm die Eier ihre definitive Bildung. (Leuckart, l. c. I, p. 265.) Der Uterus ist ein gerader Schlauch, welcher in der Achse der Proglottide verläuft und sich während der Eientwicklung fingerförmig aussackt, sodass er auf jede Seite 9—15—20 unregelmässig alternirende Zweige treibt, welche sich dendritisch spalten. Die keimbereitenden Organe bestehen aus einem paarigen Dotterstocke und aus einem unpaarigen Keimstocke. Die Dotterstöcke sind von unbedeutender Grösse, liegen zu beiden Seiten des kugligen Organs und bestehen aus einer Menge quer verlaufender Blindschläuche mit vielfach verästeltem Ausführungsgange. Der Keimstock liegt unterhalb des kuglichen Organs und ist ein bandartiger, aus einer stark geknäuelten Röhre bestehender Streifen. Beide, Eierstock wie Dotterstock enthalten kleine Zellen. Die Ausbildung der Eier geschieht im Fruchthälter und zwar in seinem hintern Ende. Das Ovarium liefert die Eier ohne Dotter und Schale und wurde deshalb von Siebold Keimstock genannt. Die Dottermasse liefert der Dotterstock. Die Eier sind klein, haben eine dünne Schale und nur wenige Dotterkörner im Umkreis des Keimbläschens. Ihr Uebertritt in den Uterus ist nur auf einen kurzen Zeitraum beschränkt und gleich nach ihrem Uebertritt beginnt auch die Embryonalentwicklung, so dass die Taenieneier immer nahezu von gleichem Alter und gleicher Entwicklung sind. Je mehr sich der Fruchthälter füllt, desto mehr

verschwinden die keimbereitenden Organe und die Hoden; sie gehen, nachdem sie ihre Bestimmung erfüllt haben, durch den Druck des wachsenden Uterus zu Grunde. In den reifen Gliedern findet man die Eier mit einer undurchsichtigen dicken Schale umgeben, welche mit senkrechten, dicht neben einander stehenden Stäbchen besetzt und oftmals noch von einer Eiweisschicht umhüllt ist. Der Durchmesser der Eier beträgt $0,03^{mm}$. Die erste Veränderung der Eier nach der Befruchtung besteht in einer Vergrösserung des Keimbläschens und in einer Zusammen-Gruppierung der Dotterkörner, welche alsbald einen runden Ballen neben dem Keimbläschen bilden. Ist das Keimbläschen um ein Drittel gewachsen, so zerfällt es in zwei Bläschen, diese in drei oder vier, welche dann alle wieder mehrfach sich theilen, bis sich schliesslich ein ganzer Haufen zelliger Körperchen gebildet hat, von fast völlig homogenem Aussehn. Seine Form ist kuglich geworden und der Durchmesser reichlich um das Doppelte des früheren Keimbläschens gestiegen; der Dotterkörper ist hierneben noch immer vorhanden. Um diese Zeit entwickelt sich um den Zellenhaufen, den spätern Embryo, die Eischale; es bildet sich ein schmaler Hof um ihn, der sich immer mehr und schärfer begrenzt und als eine in die Substanz der umgebenden Eiweissmasse eingegrabene Höhle erscheint, die mit einer wasserhellen Flüssigkeit gefüllt ist. Die Wand der Höhle erhärtet allmähig zu einer anfangs dünnen, bald aber sich verdickenden und dann mit stäbchenförmigen Höckern besetzten Membran. Gleichzeitig mit dem Emporwachsen der ersten Höcker nimmt man die erste Spur der sechs Häkchen, wodurch der Embryo aus-

gezeichnet ist, wahr, kleine Spitzen, die der, von einer zarten Cuticula bekleideten Körperfläche des Embryo aufsitzen und allmählig in die Tiefe wachsen. (Leuckart l. c. I., p. 186).

Die *Taenia solium* bewohnt einzig den Darm des Menschen und stammt von dem *Cysticercus cellulosae*, welcher vorzüglich die Muskeln und innern Organe des Schweines bewohnt, doch auch beim Rehe (Leuckart) und, nach Diesing, auch bei Affen, Hunden, Bären und Ratten, nicht aber beim Rinde (Mosler: Helminthologische Studien und Beobachtungen, c. p. 23 ff.) gelegentlich vorkommt. Dass die Taenie vom *Cysticercus cellulosae* abstammt, geht schon aus der vollkommenen Uebereinstimmung der Kopfbildung bei beiden hervor und ist auch auf experimentellem Wege nachgewiesen worden. Schon van Beneden verfütterte eine *Taenia solium* an ein Schwein und fand dasselbe nach $4\frac{1}{2}$ Monaten mit Finnen besetzt, lieferte aber nicht den Beweis, dass die Finnen von den Taenieneiern abstammten. Erst durch Küchenmeister (l. c. I. p. 76 ff.) und Haubner, denen dann auch Leuckart (l. c. I., p. 229 ff.), Eschricht u. A. beistimmten, wurde der wirkliche Beweis geliefert. Küchenmeister und Haubner, sowie Leuckart verfütterten reife Proglottiden an je fünf Ferkel und machten alle diese Thiere, bis auf zwei, finnenkrank. Dieselben wurden zu verschiedenen Terminen geschlachtet, so dass man den ganzen Entwicklungsgang der Finnen verfolgen konnte. Küchenmeister (l. c. I., p. 71 ff.) brachte dann ferner einen zum Tode verurtheilten Raubmörder während der letzten drei Tage in verschiedenen Zeiträumen 75

Stück Schweinefinnen bei, nachdem dem Delinquent schon vorher 1 *Cysticercus tenuicollis* und 6 Stück *Cyst. pisi-formes* beigebracht waren. Acht und vierzig Stunden nach der Hinrichtung fand man im Dünndarm 10, meist 3—4^{mm} lange Taenien, von denen jedoch 6 ihrer Haken beraubt waren. Um die verschiedenen, hierdurch entstandenen Zweifel zu entkräften, gab Leuckart (l. c. I., p. 223 ff.) einem 30jährigen gesunden Manne 4 Schweinefinnen ein. Drittehalb Monate nachher gingen Bandwurmglieder ab und nach vier weiteren Wochen wurden zwei, ungefähr 2^{mm} lange Bandwürmer, abgetrieben, von denen jedoch nur ein einziger ein Kopfbende hatte, welches die Bildung der *Taenia solium* trug. Auch sonst liess die Organisation der Thiere über ihre Natur keinen Zweifel. Bemerkenswerth ist das Ergebniss einer neuen Fütterung Küchenmeister's, (vergl. Leuckart l. c. I., p. 234 ff.) an einem Verbrecher mehrere Monate vor dem Tode vorgenommen. Am 24. November 1859 und am 18. Januar 1860 wurden demselben je 20 Schweinefinnen eingegeben und nach der Hinrichtung am 31. März 1860 fanden sich im Darmkanale 19 Bandwürmer, alle der *Taenia solium* angehörig, von denen 11, wenn auch nur höchstens 5 Fuss lang, doch bereits mit reifen Gliedern versehen waren, während die andern 8 sich der Reife näherten. Auch Humbert und Hollenbach haben glückliche Versuche derart an sich angestellt und es ist natürlich nach solchen überzeugenden Thatsachen kein Zweifel mehr möglich.

Die *Taenia mediocanellata* wurde früher mit der *Taenia solium* zusammen zu einer Species gerechnet

und erst Küchenmeister (l. c. I., p. 88 ff.) hat ihre spezifische Natur uns kennen gelehrt und ihre Unterscheidungsmerkmale von *Taenia solium* angegeben. Von letzterer unterscheidet sie sich besonders hierdurch: Sie ist länger, als die *Taenia solium*, bis 4^{mm}, hat constant feistere, dickere, grössere und besonders breitere Glieder. Der ansehnliche Kopf ist ohne Hakenkranz und Rostellum, hat einen flachen Scheitel und 4 Saugnäpfe, welche die der *Taenia solium* an Grösse bei weitem übertreffen, wozu noch ein fünfter Saugnapf auf dem Scheitel kömmt. (Leuckart l. c. I., p. 411). Der Uterus der reifen Proglottiden ist charakterisirt durch die grössere Menge seiner Seitenzweige, deren Zahl bis 60 und darüber steigt. (Vergl. Küchenmeister l. c. I., p. 89 ff.) Besonders hervorzuheben als Unterscheidungsmerkmal ist die Bildung des Kopfes, die Uterusform nimmt die zweite Stelle ein, während die Grösse, Breite und das feiste Aussehen der Glieder nur von unbestimmtem Werthe für die Diagnose ist. (Mosler l. c. p. 5. Leuckart l. c. I., p. 289). Die Finne bewohnt die Muskeln und innern Organe des Rindes. Die Existenz eines unbewaffneten Menschenbandwurms ist zuerst von Bremser bemerkt worden und vermuthete derselbe, dass die *Taenia solium* bei zunehmendem Alter ihren Hakenkranz verliere. Küchenmeister l. c. I., p. 88 ff.) machte zuerst auf das fehlende Rostellum aufmerksam, was doch nicht gut ausfallen könne und wies auch die andern Unterscheidungsmerkmale nach. Auch Leuckart, van Beneden, Eschricht u. a. Forscher haben dieselbe als besondere Species anerkannt. Durch verschiedene Fütterungsversuche hat

usserdem Leuckart und Mosler die specifische Natur
 usser Zweifel gestellt. Ersterer verfütterte am 13. No-
 ember 1861 eine 4 Fuss lange reife Gliederreihe an
 in Kälbchen und 8 Tage später ein kleineres Stück an
 asselbe Thier und fand, als dasselbe am 9. December
 estorben war, sämmtliche Muskeln mit weisslichen Cy-
 ten durchsetzt von 1,5—3^{mm} Breite und 2—4^{mm} Länge,
 welche je ein helles Bläschen von 0,4—1,7^{mm} enthielten.
 Die grösseren dieser Bläschen, resp. Finnen, enthielten
 schon einen Kopfpapfen, an welchem jedoch noch keine
 augnäpfe zu entdecken waren. (Leuckart l. c. I., p.
 93 ff.) Auch in einem zweiten Kälbchen brachte
 Leuckart (l. c. I., p. 406) die Finnen zur Entwicklung.
 Es wurden anfangs 25 Stück und später in Zwischen-
 räumen von 5—6 Tagen noch einige Male 5—8 Stück
 eingebracht. Der Kopf zeigte, wie sich bei zwei, in
 verschiedenen Zeiträumen an ausgeschnittenen, mit Finnen
 ersetzten Muskelstücken, vorgenommenen Untersuchungen
 herausstellte, ganz die Verhältnisse des Kopfes der *Taenia*
mediocanellata. Auch ein fernerer Fütterungsversuch
 Mosler's war mit Erfolg gekrönt. (Mosler l. c. p. 7 ff.)
 Er verfütterte an ein 2½ Monat altes Kälbchen 1863 in
 zwei Terminen, am 10. und 13. März, im Ganzen 150
 Proglottiden der *Taenia mediocanellata*. Das Thier er-
 krankte wie das erste Versuchsthier Leuckart's und
 starb unter Convulsionen am 1. April 9 Uhr Morgens.
 Bei der am Nachmittag vorgenommenen Obduction fand
 man, ganz wie bei den Fällen Leuckart's, besonders in
 den Muskeln, vorzüglich im Herzmuskel, zahlreiche tu-
 berkelartige Knötchen von 1—3^{mm} Breite, 2—4^{mm} Länge,

in welchen beim Einschneiden je ein *Cysticercus*bläschen sich vorfand ($0,5-1,5^{mm}$). Bemerkenswerth war in allen diesen Fällen — und das unterscheidet den *Scolex* der *Taenia medicanellata* wesentlich von dem der *Taenia solium* — die mehr oder weniger intensive Erkrankung des Lymphgefässsystems und die massenhafte Anwesenheit von *Cysticercen* in der Herzsubstanz (acute Cestodentuberculose). Auch darin unterscheidet sich der *Cysticercus cellulosae* von dem der *Taenia mediocanellata*, dass des ersteren Kopfzapfen stets im *Receptaculum* geknickt ist, während sich bei dem letztern zu keiner Zeit eine Knickung nachweisen lässt. Um die Specificität der Taenie noch weiter zu beweisen, versuchte Leuckart (l. c. I., p. 747) wiederholt die Finne der *Taenia mediocanellata* im Schweine gross zu ziehen, doch ohne Erfolg. Ebenso erlangte Mosler bei einer Fütterung der *Taenia solium* an ein Rind nur ein negatives Resultat. (l. c. p. 23 ff.)

Was den Bau der *Taenia mediocanellata* betrifft, so haben die Glieder eine ausserordentliche Tendenz in der Breite zuzunehmen. Dieselben sind anfangs 1^{mm} lang 3^{mm} breit und diese Breite bleibt noch lange Zeit bei den Gliedern vorherrschend, wodurch die erste Hälfte der Glieder ein Ansehen erhält, wie *Bothriocephalenglieder* mit seitlichem *Porus genitalis*. In der zweiten Hälfte gewinnt die Länge das Uebergewicht, so dass wir zuletzt Glieder von $1''-1\frac{1}{4}''$ Länge und nur $3'''-4'''$ Breite antreffen. Die Kalkkörperchen unserer Taenie sind dicht wie bei *Taenia solium*, die Muskulatur ist stärker entwickelt, woher auch das feistere Aussehn rührt. Zwischen

radiären Faserzügen der Rindenschicht bemerkt man den reifen Gliedern oft Anhäufung von Molekularnern. Auch Fetttropfen findet man nicht selten in der Rindenschicht, und zwar in solcher Menge, dass die Grenzen dadurch grün gefärbt werden. Im Uebrigen stimmt der Bau der *Taenia mediocanellata* mit dem der *Taenia solium* übereinstimmend. Die Embryonalentwicklung nimmt eine beträchtlich grössere Anzahl von Gliedern in Anspruch, als dies bei der *Taenia solium* der Fall ist: 320 statt 200. Die erste Anlage der Geschlechtsorgane unterschied Schmidt im 350. Gliede, vorher waren die Genitalgänge, der Uterus und der Cirrusstiel bereits differenzirt. Die vollständige Geschlechtsanlage fällt in die ersten Glieder des 5. Hunderts. Im 550. Gliede beginnt die Füllung des Uterus, im 550. die Anlage der Seitenzweige. (Leuckart l. c. I., p. 10 ff.) Die Eier sind denen der *Taenia solium* gleich, also ist dies die Embryonalentwicklung. Die *Taenia mediocanellata* bewohnt nur den Dünndarm des Menschen. Die *Taenia nana* ist von Bilharz in Aegypten entdeckt und einmal bei einem, an Meningitis verstorbenen Knaben in grösserer Menge im Duodenum aufgefunden. Sie ist zuerst von Siebold, jedoch nur oberflächlich, beschrieben und hat eine Länge von 15^{mm} und die grösste Breite von 0,5^{mm}. Der Kopf, fast um die Hälfte dicker, als der auf ihn folgende Hals, ist kugelig, hat einen Durchmesser von etwa 0,3^{mm} und trägt, ausser zwei rundlichen Saugnäpfen von 0,1^{mm}, ein ovales Rostrum von 0,06^{mm} Länge, dessen vorderen abgestumpften Ende eine einfache Reihe äusserst feiner Häkchen

aufsitzt, deren Zahl 22—24 beträgt. Die Häkchen stehen, wie bei den übrigen Bandwürmern, aus einer Krallen- und zwei Wurzelfortsätzen, deren vorderer stark massiv, deren hinterer aber dünner und schlanker ist. Die Länge der Haken, welche insgesamt die gleiche Grösse haben, beträgt $0,018^{mm}$, die Spannung der Wurzelfortsätze $0,015^{mm}$ (Leuckart l. c. I., p. 394). Der Leib ist im vorderen Dritttheile fadendünn, erweitert sich aber gegen die Mitte hin rasch, so dass er bald darauf das Maximum seiner Breite erreicht hat. Die Zahl der Proglottiden beläuft sich ungefähr auf 150—170, von denen die letzten 20—30 mit reifen Eiern versehen sind. Die Länge der Glieder ist unbedeutend und beträgt auch im letzten Körperende kaum den vierten Theil der Breite. Der Uterus wiederholt die Form der Glieder und enthält in reifen Gliedern zahlreiche Eier von $0,04^{mm}$ Durchmesser, mit Embryonen von $0,023^{mm}$. Die Eier haben zwei dünne, helle Eihäute. Der Cirrusbeutel verläuft in der Nähe des vorderen Gliedrandes in querer Richtung; er ist keulenförmig, mit seinem verdickten Ende in der Mitte des Gliedes gelegen und hat in seinem Innern einen cylindrischen Gang mit kegelförmigem Ende. Mehr in der Mitte des Gliedes liegen die verpackte Lappen und Ballen mit starkem Lichtbrechungsvermögen, eine zweilappige Figur darstellend. Es folgt der Dotterstock und hart hinter ihm liegt der Eierstock, welcher von feinkörniger Beschaffenheit ist. Hoden sind bis jetzt nicht aufgefunden, liegen aber wahrscheinlich zu den Seiten der weiblichen keimbereitenden Organe. Die Vagina, neben dem Cirrusbeutel gelegen, ist keulen-

und mündet in das Receptaculum seminis, einen birn-
förmigen, nach innen vom Cirrusbeutel gelegenen Körper.
Kalkkörperchen sind nur in geringer Menge durch das
Cirrusparenchym verbreitet. Das Herkommen dieses
Tausendwurms ist unbekannt; wahrscheinlich verlegt er,
nach der Analogie mit verwandten Arten zu schliessen,
eine Jugendform in einem Insekt. (Leuckart l. c. I.,
397.)

Die *Taenia flavo-punctata* ist bis jetzt einmal,
in Boston, beobachtet, wo sechs Exemplare derselben
dem 19 Monate alten Kinde abgegangen waren. Be-
schrieben hat sie zuerst Weinland. Diese Taenie er-
reicht eine Länge von etwa 1 Fuss. Der Kopf ist nicht
bekannt, trägt aber vermuthlich eine einfache Reihe
von Haken. Die vordere Körperhälfte besteht aus
kurzen, 0,2—0,5^{mm} langen und 1—1,25^{mm} breiten Gliedern,
die nach hinten zu in der Mitte einen gelben Fleck,
das Receptaculum seminis, erkennen lassen. In der
hinteren Hälfte steigt die Länge der Glieder auf 1^{mm},
die Breite auf 2—2,3^{mm}. Der gelbe Fleck ist ver-
schlungen, aber durch die massenhafte Entwicklung von
Eiern haben die Glieder eine bläulichgraue Färbung an-
genommen. Die Eier sind von einer zweifachen, glatten
Schale umgeben, und besitzen eine Grösse von 0,06^{mm},
enthalten einen 6hakigen Embryo. Der Bau der
T. elliptica ist der vorhergehenden Art analog. (Leuckart
l. c. I., p. 399). Kalkkörperchen sind auch bei dieser
nur spärlich und klein. Ueber ihre Abstammung
dasselbe, wie über die der *Taenia nana*.

Die *Taenia elliptica*, welche bei den Katzen

als Schmarotzer vorkommt, ist einige Male beim Menschen gefunden worden. Schon Linné giebt an, *Taenia canina* -- worunter bis Rudolphi der Hundbandwurm, *Taenia cucumerina*, und der Katzenbandwurm *Taenia elliptica*, begriffen wurden und auch jetzt noch wohl begriffen werden, was jedoch nach Leuckart (l. c. I, p. 402) auf keinen Fall zulässig ist -- eigentlich auch beim Menschen gefunden zu haben. Die bewährtesten Helminthologen widersprechen dieser Angabe (Pallas, Goetze) und die einfache Notiz Eschricht's, dass er unter verschiedenen Helminthen auf St. Thomas auch eine *Taenia elliptica* gefunden habe, die einem Negersclaven abgegangen sein sollte, war so oberflächlich, als dass man hierauf hin diese Taenien unter die Zahl der menschlichen Helminthen hätte aufnehmen können.

In der Halle'schen vergleichenden anatomischen Sammlung wird aber ein Glas aufbewahrt, welches, nach der Etiquette ein *Convolut Taenia canina* enthält, die ein Knabe Krebs, während seines Aufenthalts auf der chirurgischen Klinik abgegangen sind. Diese angeblichen *Taeniae caninae* sind, nach der Untersuchung Leuckart's (l. c. I., p. 403) *Taeniae ellipticae*, zwischen 40--50 Stück, haben eine Länge zwischen je 100--130 und sind meist noch ohne Eiconglomerate. Einen zweiten Fall hat Weinland mitgetheilt. Er betrifft ein dreizehnmonatliches Kind aus Esslingen, dem von zu Zeit Proglottiden abgingen, die Weinland als Proglottiden der *Taenia cucumerina* in Anspruch nahm. Nach Leuckart's (l. c. I., p. 403 ff.) Meinung ist

zweifelhaft, ob dieselben der *Taenia elliptica* oder *cucumerina* angehören. Auch in einem dritten Falle, welchen Leuckart durch Schmidt erfuhr und der ein 13 Monate altes Kind betraf, blieb es zweifelhaft, ob das $\frac{1}{3}$ Fuss lange Bandwurmstück der *Taenia elliptica* oder *cucumerina* zuzurechnen sei. Die Jugendzustände beider Taenien sind noch unbekannt, existiren aber wahrscheinlich in Insecten oder deren Larven. (Leuckart, l. c. I., p. 404.) Die *Taenia elliptica* hat im reifen Zustande eine Länge von 150—200^{mm} und in den letzten Gliedern eine Breite von 1,5—2^{mm}. Der Kopf ist doppelt so dick als das fadenförmige vordere Körperende (0,15^{mm}). Der Rüssel bildet im ausgestreckten Zustande einen schlanken cylindrischen Vorsprung von 0,1^{mm}. Die Zahl der Haken, welche in 3—4 unregelmässigen Reihen stehen und statt der Wurzelfortsätze eine Fuss Scheibe besitzen, beträgt etwa 60. Die kleinsten Häkchen messen nur 0,0037^{mm} Höhe, sie nehmen die letzte Reihe ein und sind etwa 30 an der Zahl. Die grössten Häkchen haben eine Höhe von 0,015. Die Fuss Scheibe der Häkchen hat einen Durchmesser, der der Höhe gleichkommt. Die Glieder setzen sich mit zunehmender Grösse immer schärfer gegen einander ab, indem sich die Verbindungsstellen einschnüren, die Ecken abrunden. Die ersten 40 Glieder sind von unbedeutender Länge, strecken sich dann aber beträchtlich, so dass die letzten 3—4 mal länger, als breit sind. Die männliche Reife beginnt im 46. Gliede und im 60. ist die Embryonalentwicklung schon vollendet. Der *Porus genitalis*, oder, da männliche und weibliche Organe getrennt münden, ohne Kloake, der

Ausgang der Geschlechtsorgane ist doppelt, der eine auf dem rechten, der andere auf dem linken Seitenrande, ungefähr in der Mitte der Glieder. Beide haben ein Vas deferens und eine Vagina. Letztere verläuft, bevor sie die Medianlinie erreicht, nach abwärts und ist hier mit zwei flügel förmigen Dotterstöcken und einem einfachen Eierstocke verbunden. Der Uterus hat zahlreiche runde Taschen, welche in der Mittelschicht neben einander liegen und sich bis an die, in den Seitenecken dieser Schicht gelegenen, Längskanäle ausbreiten. Der Inhalt dieser Taschen wird nach Vollendung der Embryonalentwicklung, in eine gemeinsame feste Bindesubstanz von röthlich-brauner Färbung eingeschlossen. Die Zahl der auf diese Weise zusammengeklebten Eier ist nach der Grösse der Taschen verschieden 8—10—70. Der Durchmesser der Eihäufen variirt von 0,07—0,2^{mm}, während die isolirten Eier 0,05^{mm} messen. Der Embryo hat 0,033^{mm} und die Grösse seiner Haken beträgt 0,01. Die Kalkkörperchen der Taenia sind ziemlich zahlreich.

Aus der Familie der Bothriocephalidae kennen wir zwei bei dem Menschen schmarotzende Arten, den Bothriocephalus latus und den Bothriocephalus cordatus.

Der Bothriocephalus latus ist der ansehnlichste menschliche Bandwurm, misst mitunter 5—8 Mtr. und besteht dann aus 3 — 4000 kurzen und breiten Gliedern. Bis zum 17. Jahrhundert wurden die Taenia solium und der breitgliedrige Bandwurm allgemein zusammengeworfen und erst Plater hat sie unterschieden, weshalb man von einer Taenia prima und secunda Plateri sprach. Anderson nannte sie mit Rücksicht auf das vorspringende Mittel-

feld und die „wie zu einer Wirbelsäule“ an einander gereihten Eihaufen *Taenia à épinée*, während Bonnet besonders die *Stigmata umbilicalia* hervorhob und mit Rücksicht auf die Gliederform sie *Taenia à articulations courtes* nannte. Erst seit Bremser aber wissen wir, dass die *Taenia lata* Linné's keine *Taenie* ist. Er hat sie zuerst vollständig beschrieben und ihr den Namen Grubenkopf, *Bothriocephalus*, gegeben.

Der *Bothriocephalus* hat im frischen Zustande ein weniger opakes Aussehen als die *Taenien*, was wahrscheinlich von dem fast gänzlichen Mangel an Kalkkörperchen herrührt. (Leuckart, l. c. I., p. 424.) Die gelblich-graue Färbung der Seitenfelder rührt von den grossen, in der Rindenschicht gelegenen Körnerhaufen ($0,1—0,16^{mm}$), welche aber nicht aus Kalkkörperchen bestehen, her. (Leuckart, l. c. I., p. 425 gegen Küchenmeister l. c. I., p. 52). Die Anordnung der Gewebe ist wesentlich dieselbe, wie bei den *Taenien*. Man unterscheidet dieselbe Rinden- und Mittelschicht, denselben Verlauf der Muskelfasern, dieselbe Lagerung der Geschlechtsorgane. Nur die eben erwähnten Körnchenhaufen fehlen bei den *Taenien* zwischen den Radialfasern der Rindenschicht. Eschricht und Siebold betrachten diese Haufen als Drüsen, welche, ohne Eierstöcke zu sein, bei der Bereitung der Eier eine Rolle spielten, was Leuckart aber bestreitet, theils weil er keinen Zusammenhang mit der Mittelschicht nachweisen konnte, theils weil die Dotterstöcke der doch sonst so nahe verwandten *Taenien* eine ganz abweichende Lage besitzen, theils endlich weil bei den *Bothriocephalen* ein paar Organe gefunden wer-

den, die den Dotterstöcken in jeder Weise entsprechen. Er vermuthet, dass die Körnchenhaufen von Excretionsstoffen gebildet werden. Die Längskanäle sind weniger entwickelt und enger als die der Taenien und der Medianlinie angenähert. Im Kopfe lösen dieselben sich baumartig in feinere Zweige auf (Siebold) und ebenso soll, nach Knoch, unter der Haut ein maschenreiches Gefässnetz bestehen, das mit den tiefer liegenden Stämmen im Zusammenhang stehe und durch Flimmerhaare eine Körnchenbewegung unterhalte.

Der Kopf ist stumpf konisch, hat eine Länge von $2,5^{mm}$, eine Breite von 1^{mm} und ist gegen den Hals in Form einer ovalen Anschwellung abgesetzt. Die Compression des Kopfes entspricht der Abplattung des Körpers, doch ist sie im Ganzen nur gering. An den Seitenrändern desselben laufen der ganzen Länge nach zweispaltförmige Sauggruben hin. Sein Scheitel ist eben, fast etwas concav.

Die Länge der Glieder beträgt, mit Ausnahme der letzten, nur selten mehr als $3,5^{mm}$, während die Breite gegen die Mitte hin auf $10-12^{mm}$, nach einigen Angaben sogar auf 24^{mm} heranwächst. In der hintern Hälfte nimmt die Breite wieder ab, während die Länge wächst, so dass die letzten Glieder eine fast quadratische Form von $4-5^{mm}$ haben. Dabei ist der Körper dünn und flach wie ein Band, vorzüglich in den Seitentheilen, während das Mittelfeld in Form eines Längswulstes nach Aussen vorspringt. Nur der vordere Körpertheil ist hierin verschieden und macht auch in so fern eine Ausnahme, als er sich immer mehr verschmälert, bis er

schliesslich fadendünn wird. Die ersten reifen Glieder trifft man, nach mindestens 600 unreifen, 5—600^{mm} hinter dem Kopfe. Sie sind 5^{mm} breit, 2^{mm} lang. Während die Anfangs nur geringe Zahl der Eier im Uterus rasch anwächst, wird das Mittelfeld blasenartig aufgetrieben, so dass also von hierher der Längswulst in der Mitte der Glieder stammt. Der Uterus ist Anfangs ein einfacher Kanal, der in Schlangenwindungen von hinten nach vorn in der Mitte der Glieder verläuft und auch zugleich als vagina fungirt. Sammeln sich die Eier in ihm an, so legen sich die seitlichen Bögen in Form einer Rosette zusammen mit 4—5 Schlingen auf jeder Seite, welche je eine Weite von 1—1,5^{mm}, eine Länge von 3—4^{mm} haben. Zwischen den beiden letzten Hörnern und dem Hinterrande des Gliedes liegen zwei Organe, welche Eschricht Knäuel und Knäueldrüse benennt. Das Knäuel, ein zwei bis dreimal gewundener Kanal, welcher sich nach vorn erweitert, ist das Ende des Uterus. Die untern Schlingen dieser Röhre führen oft nur eine Reihe Eier, enthalten aber ausserdem zahlreiche feine Dotterkörner. Das untere Ende erweitert sich in einen ziemlich ansehnlichen Sack (0,25^{mm} lang, 0,09^{mm} breit) von keulenförmiger Gestalt, der in querer Richtung, bald rechts, bald links von der Mittellinie gelegen ist und in welchem man Eier, zum Theil noch ohne feste Schale und zahlreiche Dotterkörner antrifft. Auf diese Erweiterung läuft geschlängelt und in querer Richtung ein dünner und heller Gang zu und öffnet sich in dieselbe in einiger Entfernung von dem blinden hintern Ende. Es ist dies der Ausführungsgang des Ovariums. Das

Ovarium, die Knäueldrüse Eschricht's, liegt an der Rückenfläche des Knäuels, ist ein scheibenförmiges Organ aus dicht verfilzten Blindschläuchen bestehen, in welchen man Eizellen antrifft (Leuckart l. c. I., p. 430 ff.) An der Aussenseite der letzten Uteruskörner liegen zwei grosse flügelartige Organe und reichen bis zur Mitte des Gliedes, die sogenannten Seitendrüsen. (Eschricht, vgl. Küchenmeister l. c. I., p. 53 ff.) Sie sind weniger parenchymatös, als die Knäueldrüse, bestehen aus einer Anzahl dünner und verästelter Kanäle und wurden von Eschricht als Ovarium gedeutet, während Leuckart sie als Dotterstock in Anspruch nimmt (l. c. I., p. 432). Die reifen Eier sind oval und durchschnittlich $0,07^{mm}$ gross. Sie sind von einer einfachen braunen Schale umgeben, deren vorderer Pol ein kappenförmiges Deckelchen besitzt. Die Geschlechtsöffnungen liegen auf der Bauchfläche und zwar in deren Mitte, die weibliche Oeffnung hinter der grösseren männlichen; beide Oeffnungen sind isolirt, ohne gemeinschaftliche Genitalkloake. Der Cirrusbeutel ist eine rundliche Scheibe von ansehnlicher Grösse ($0,38^{mm}$), welche den ganzen Raum bis zum Vorderrande des Gliedes einnimmt. Die Geschlechtsöffnung liegt excentrisch unterhalb der Mitte. Der Cirrus ist ein eiförmiger Körper und besitzt eine dicke Lage ringförmiger Muskelfasern. Das Vas deferens ist spiralförmig gewunden und wird vor seinem Eintritt in den Cirrusbeutel von einem kugligen Körper von brauner Farbe umfasst. Die Bildung und Lage der Hoden ist dieselbe wie bei den Tänien.

Die reifen Eier lassen bei ihrer Entleerung durch

die weibliche Oeffnung, welche in den letzten Gliedern regelmässig von Statten zu gehen scheint, noch keine Spur von Embryonalentwicklung erkennen. Dieselbe geht vielmehr erst nach längerer Aufbewahrung der Eier in Wasser vor sich, wie das zuerst von Schubart beobachtet worden ist. Auch Leuckart bestätigt dies und zwar war, nach seinen Untersuchungen, schon nach etwa 6—8 Wochen in einzelnen Eiern ein sechshakiger Embryo vorhanden, von rundlicher, blasser Form ($0,045^{mm}$) mit ziemlich scharfen Contouren. (l. c. I., p. 758). Die Embryonalentwicklung konnte nicht vollständig verfolgt werden, schien aber keine Abweichungen darzubieten. Die Substanz des Embryo besteht aus zarten Zellen ($0,004^{mm}$) und seine 6 Haken sind alle von gleicher Grösse ($0,015^{mm}$), mit scharf abgesetzter Kralle ($0,006^{mm}$). Die ausgebildeten Embryonen schlüpfen im Wasser aus, nachdem sie das Deckelchen, womit das Ei versehen ist, abgeworfen haben. Sie tragen einen dicht mit feinen Flimmerhaaren besetzten Mantel und drehen sich beim Umherschwimmen beständig im Wasser langsam und gravitätisch herum. Nachdem sie 4—6 Tage (Knoch) im Wasser umhergeschwommen und während dessen, durch Wasseraufnahme, beträchtlich gewachsen sind, streifen die Embryonen ihren Mantel ab. Beim Hervortreten aus seiner bisherigen Hülle ist der Embryo mit einer hellen Eiweisschülle umgeben, welche nach einiger Zeit zerfliesst. Die weiteren Schicksale dieses Embryo bis zu seinem Uebergange in die definitive Gestalt sind uns bis jetzt noch unbekannt. Freilich behauptet Knoch, dass die Embryonen auf passive Weise in den Darmkanal

ihres definitiven Trägers gelangen und sich dort, ohne Zwischenwirth und Zwischenform, zum Bandwurm entwickeln, allein seine zum Beweise dieser Ansicht angestellten Versuche sind doch zu unzureichend und die aus denselben gezogenen Schlüsse zu gewagt, als dass wir darauf hin ohne Weiteres seiner Ansicht beitreten könnten. Er verfütterte zunächst die Embryonen an verschiedene wirbellose Thiere, doch ohne irgend ein Resultat. Ebenso erging es ihm bei Fischen und Fröschen, bei denen sich allerdings in einigen Fällen einzelne, erst sehr wenig entwickelte Cestodenkapseln, die augenscheinlich den Botriocephalen angehörten, doch für die Abstammung von den gefütterten Keimen keine Anhaltspunkte fanden. Ebenso war auch ein Versuch einer direkten Uebertragung in Hirn, Auge u. s. w. bei Hunden, Katzen und andern Thieren ohne Erfolg geblieben. Hierauf gestützt glaubte Knoch annehmen zu müssen, dass die Bothriocephalen sich ohne Zwischenzustand entwickeln, es ist aber doch immer sehr leicht möglich, dass Knoch zu seinen Versuchen die unrichten Thiere gewählt habe. Aber Knoch hat auch positive Resultate erzielt. Er verfütterte im Februar 1859 zerschnittene Proglottiden an eine junge Hündin, die noch gesäugt wurde und zwar mehrmals binnen 8 Tagen und fand nach 4 Monaten im mittleren Theile des Dünndarms 7 Stück unseres Bothriocephalus, von denen einige schon geschlechtsreif, andere erst zwei Zoll lang waren. Obgleich nun Knoch diesen Versuch für entscheidend hält, um so mehr, da auch Pelikan bei einer Fütterung an einen Hund einen Bandwurm erzielt habe, so hat er doch

nicht den Beweis geliefert, dass die vorgefundenen Würmer von den Eiern abstammen. Schon die bedeutende Verschiedenheit in der Grösse der vorgefundenen Thiere spricht sehr gegen die Beweiskraft dieses Experimentes und ebenso verhält sich das bei den andern von Knoch angestellten Fütterungsversuchen (vergl. Leuckart l. c. I., p. 763 ff.) Leuckart hat bei seinen Fütterungsversuchen bei Hunden stets ein negatives Resultat erzielt, auch selbst ein Dutzend Embryonen verschluckt, aber nach fast 3 Monaten kein Zeichen von der Anwesenheit eines Bandwurms auffinden können. Es bedarf also jedenfalls einer grössern Reihe von Experimenten, ehe man den Knoch'schen Angaben Glauben schenken kann und vorläufig ist die alte Annahme, dass wir die Bothriocephalenkeime durch Zwischenträger, vielleicht Fische, erhalten, durchaus noch nicht widerlegt.

Der *Bothriocephalus cordatus*, welcher im nördlichen Grönland zu den verbreitetsten Helminthen des Hundes gehört, ist dort bis jetzt einmal beim Menschen gefunden worden und zwar bei einem Mischling, welchem zwei Exemplare während der Schwangerschaft abgingen. Beschrieben ist derselbe zuerst von Leuckart (l. c. I., p. 437 ff.) Der *Botriocephalus cordatus* ist dem vorhergehenden nicht unähnlich, steht aber an Grösse bedeutend hinter demselben zurück und hat eine mehr gedrungene Form. Besonders abweichend ist die Bildung des Kopfes und des vorderen Körpertheiles. Der *Bothriocephalus* hat einen kurzen, breiten, herzförmigen Kopf von 2^{mm} Länge und gleicher Breite an der Basis. Das vordere Ende ist von der Mitte an zugespitzt, während

die hintern Seitentheile, je nach der Grösse der Contraction, mehr oder weniger prominiren. Die Abplattung des Kopfes nimmt nach der Spitze hin zu, ist aber nicht sehr beträchtlich. Die Sauggruben sind nicht randständig, sondern flächenständig, sodass die Seitenränder des Kopfes in der Mittellinie der Körperfläche vorspringen. Die Tiefe dieser Sauggruben ist beträchtlich, sodass beide nur durch eine schmale Substanzbrücke getrennt sind, und zwar ist dies besonders in der vorderen Kopfhälfte der Fall, während jenseits der Mitte die Tiefe und Geräumigkeit derselben abnimmt, bis schliesslich nur noch eine schmale Längsfurche übrig bleibt. Statt des langen fadenförmigen Halses, den wir beim vorigen Bandwurm fanden, folgt bei unserem *Bothriocephalus cordatus* auf den Kopf sogleich der breite Leib mit seinen Segmenten, welche, von Anfang an deutlich mit den Augen erkenntlich, durch ihr rasches Wachsthum dem Vorderkörper eine lancettförmige Gestalt geben. Schon 3 Ctm. hinter dem Kopfe sind die Glieder geschlechtsreif und nach weiteren 3 Ctm. haben sie fast ihre volle Breite erreicht (7—8^{mm}). Die Zahl der unreifen Glieder beträgt höchstens 50 und von diesen zeigt die grössere Mehrzahl schon Genitalöffnungen, nur die hartschaligen Eier fehlen noch im Fruchthälter. Die Länge der reifen Glieder beträgt durchschnittlich 3—4^{mm}; sie können sich jedoch wegen der starken Contractionsfähigkeit unseres Wurmes bis auf 1,3^{mm} verkürzen. Die letzten Glieder sind von quadratischer Form (5—6^{mm}). Die Anzahl der Glieder überhaupt betrug bei dem grössten von Leuckart (l. c. I., p. 479) untersuchten Exemplare, welches 115^{mm} lang

, 660, in der Regel sind nur 400 vorhanden. Die te der Rückenfläche ist von einer Längsfurche durch- en, eine gleiche ist auf der Bauchfläche unterhalb der chlechtsöffnungen zu erkennen. Sehr charakteristisch Unterscheidung vom *Bothriocephalus latus* ist noch grosse Menge von Kalkkörperchen, welche durch das perparenchym verbreitet ist.

Der Bau der Geschlechtsorgane ist derselbe wie bei *Bothriocephalus latus*, nur zeichnet sich der Cirrusbeutel ch beträchtlichere Grösse aus ($0,6^{mm}$ lang, $0,43^{mm}$ t). Die Uterusrosette ist schmaler und länger und eine grössere Zahl von Seitenhörnern (6—8). Die r sind etwas grösser, $0,075$ — $0,08^{mm}$ lang, $0,05^{mm}$ t. Unter den von Leuckart untersuchten (20) Exem- en fanden sich auch einige Jugendformen vor und zwar s der kleinste der Würmer nur 30^{mm} und hatte ein es, fast durchsichtiges Aussehen, nicht blos wegen gels der Rindenkörner, sondern namentlich auch we- der Dünne des Körpers und der schwachen Entwickel- g der Muskulatur. Die grösste Breite erreichte er n in geringer Entfernung vom Kopfe. Das vordere perende hatte also schon dieselbe Beschaffenheit wie erwachsenen Würmern, das hintere Dritttheil hinge- verschmälerte sich immer mehr und lief schliesslich eine dünne Spitze aus. Der Kopf hatte gleichfalls n die spätere Form, aber eine viel geringere Grösse (mm), während der Leib in ungefähr 180 Segmente ge- lt war, von denen die mittelsten die breitesten und sten waren. Diese Bildungsverhältnisse wiederholten auch bei den übrigen Exemplaren, welche 40 — 100^{mm}

massen. Die Zahl der Segmente war ungefähr diese 125—154. Ein Unterschied bestand, ausser in der Grössenzunahme der Glieder, noch in der Geschlechtsentwicklung. Schon bei 80^{mm} langen Thieren fand man bei den mittleren Gliedern, welche den übrigen an Grösse noch immer voraus waren, Geschlechtsöffnung mit Ovarienbeutel, die aber erst bei 100^{mm} Länge genau zu erkennen waren, während gleichzeitig das Mittelfeld die Form eines Längsbandes aufgewulstet erschien. Erst in einem Exemplare von 27 Ctm. waren alle Glieder mit Ausnahme der ersten 40—50 zur Reife gelangt, während der Wurm 184 Proglottiden besass. Der *Bothriocephalus cordatus* und mit ihm auch wohl die andern *Bothriocephalen* beschränken sich demnach ohne Zweifel nach ihrer Einwanderung auf ein Wachsthum ihrer Proglottitheile, des Kopfes sowohl, wie der Glieder, die wahrscheinlich schon in dem ersten Träger, mit dem Kopf zugleich ihren Ursprung nehmen. Die Neubildung neuer Glieder beginnt erst später, nachdem die vorhandenen zur Geschlechtsreife gekommen sind. (Vgl. Leuckart l. c. I., p. 446 ff.) Ueber die anfängliche Entwicklung des *Bothriocephalus cordatus* ist nichts Näheres bekannt, doch erhalten die Eskimos denselben wahrscheinlich durch irgend ein Wasserthier, vielleicht durch irgend einen Fische.

Aus der Klasse der Nematoden beherbergt der Mensch in seinem Darmkanale folgende Arten: die *Ascaris lumbricoides* und *mistax*, den *Oxyuris vermicularis*, den *Dochmius duodenalis* und den *Trichocephalus dispar*.

Die *Ascaris lumbricoides*, der gemeine Stielwurm, ist der grösste und zugleich nahezu der häufigste.

im Darmkanal schmarotzenden Rundwürmer. Das Weibchen wird bis gegen 400^{mm} lang und 5,5^{mm} dick, das Männchen ist kleiner, nur selten über 250^{mm} lang, (2,5^{mm} dick) und schlanker als das Weibchen. Die frischen Exemplare haben alle eine mehr oder minder röthliche oder braune Färbung mit ziemlich durchsichtigeren Körperhüllen. Der ziemlich unangenehme Geruch der frischen Exemplare rührt von einem Riechstoffe her, welcher hauptsächlich in den Muskelblasen seinen Sitz hat, und, da er durch Alkohol ausgezogen wird, dem Nematoden eine ölige Beschaffenheit besitzt (Leuckart II., 195.) Die Cuticula, wie überhaupt bei den Nematoden ein Absonderungs-Produkt der subcuticulären Epithelzelle, gehört zu den Chitinen, ist farblos und glatt, hat eine ansehnliche Festigkeit und eine Dicke bis zu 0,5^{mm}, welche letztere mit Ausnahme der Lippen nach dem Vordringen in den Wirtskörper abnimmt. An den Seitenflächen unterscheidet man schon mit unbewaffnetem Auge zwei Längsnäthe, welche auf den noch näher zu beschreibenden Seitenlinien verlaufen und durch bogenförmige Querlinien — Falten der Cuticula, die unter gewissen Umständen verstreichen, während die Längsnäthe persistiren von Zeit zu Zeit in Verbindung stehen. Die Cuticula besteht aus mehreren Schichten, die sich scharf voneinander absetzen. Die äussere Lage, die Epidermis, ist die dünnere, aber zugleich festere. Sie schlägt sich wie überhaupt bei den Nematoden, durch die nachgehenden Oeffnungen nach Innen um und bekleidet die folgenden röhrigen Gebilde eine mehr oder minder lange Strecke. Bis auf die Lippen und das Schwanzende

ist dieselbe geringelt und zwar rührt diese Ringel von regelmässig hinter einander liegenden Bändern, welche an den Seitentheilen unterbrochen und mit ihren zugespitzten Enden in einander gefügt sind. Die Ringe bilden also Halbkreise und ihre Breite wächst bei zunehmendem Körpervolumen und zwar beträgt bei grösseren Exemplaren etwa $0,012^{mm}$. Die zweite dickste Lage ist nicht geschichtet, lässt aber an manchen Stellen eine leichte Streifung erkennen. Nach ihr folgen noch zwei Schichten mit diagonalem Faserverlauf, deren Fasern, die obere nach rechts, die untere nach links verlaufen und unter diesen liegen noch zwei Schichten, deren untere eine ungewöhnlich helle Beschaffenheit zeigt. Die Haut der Ascariden ist doppelt lichtbrechend. (Lückart l. c. II., p. 163 ff.) Die subcuticuläre Körnerlage ist ansehnlich dick, bis $0,016$ an einzelnen Stellen und enthält zahlreiche fein gespaltene Querfasern. Sie steht mit den Muskeln, den Nerven und den Excretionsorganen im Zusammenhang und erhebt sich an vier Stellen zu strang- und wulstförmigen Verdickungen, welche die Unterbrechung der Muskulatur in die Leibeshöhle eintragen. Es sind dies die allgemein bei den Nematoden vorgefundenen Längslinien, deren zwei dickere in der Mitte der Seitenflächen angehören (Seitenlinien), die beiden schwächeren der Medianlinie des Bauches und Rückens entsprechen. Die Seitenlinien sind zwei weisse Fäden von fast $0,5^{mm}$ im Durchmesser, haben ihre grösste Entwicklung in der vorderen Körperhälfte und nehmen nach hinten ab, bis sie hinter der Afteröffnung mit der subcuticulären Körnerlage verschmelzen. Die Median-

sind zwei dünne Streifen, welche leicht übersehen werden, da sie unter der Muskulatur versteckt sind und nach Innen gekehrter freier Rand eine beträchtliche Verdickung zeigt. Die freie Oberfläche der Längs- ist mit einer eignen Membran bekleidet, welche in der Mitte eine Duplicatur bildet, die durch die ganze Länge der Linien hindurchzieht und die Körnermasse in eine rechte und linke Hälfte theilt. In den Seitenlinien verläuft zwar im dicksten Theile der Scheidewand, verläuft ein Excretionsgefäß, welches schon den älteren Zoologen bekannt war, aber für ein Blutgefäß gehalten wurde (Bojanus, Clocquet), bis uns Schneider mit der wahren Natur desselben bekannt machte. Sie mündet durch eine Oeffnung in die Medianlinie des Bauches, in der vorderen Körperende, eine kurze Strecke hinter dem Mundring. Diese Oeffnung ist nur eng, ebenso der Kanal, in den sie sich fortsetzt, und welcher nach kurzem Verlauf in zwei Schenkel zerfällt, die bogenförmig nach den Seitenwülsten emporsteigen, in denen sie dann nach hinten verlaufen. Die Flüssigkeit, welche der excretorische Apparat enthält, ist hell und körnerlos, ihre chemische Beschaffenheit ist unbekannt, doch enthält sie wahrscheinlich stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte, obwohl Schneider keine Harnsäure nachweisen konnte. Die Wandungen sind dünne, strukturlose Membranen ohne Muskulatur, so dass die Fortbewegung der Flüssigkeit wohl nur durch die Contractionen des Thierkörpers geschieht. Verästelungen sind bis jetzt noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Früher hielt man diese Längs- nicht bald insgesammt, bald die Seitenlinien oder Me-

dianlinien allein für Nervenstränge. Bojanus und Sibold sprachen ihnen die Nervennatur gänzlich ab. Meissner vindicirte dann später den Nematoden ein vollkommenes Nervensystem und zwar sowohl ein centrales, den Schlundring und eine gangliöse Verdickung am Analende des Körpers, als auch ein peripherisches in den Seitensträngen und dem medianen Bauchstrange, welches vermittelt des sogenannten terminalen Dreiecks mit den Muskelblasen im Zusammenhang stehen sollte. Er ja selbst ein sympathisches System wollte er in einem am Bauche verlaufenden Faden gefunden haben. Es wurden aber seine Angaben von Claparède und Schneider, Leydig und Ebert angegriffen und zum grösssten Theile widerlegt.

Nach den neuern Untersuchungen (Leuckart l. c. p. 24 ff.) verhält es sich mit dem Nervensystem der Nematoden überhaupt und des Spulwurms im Besonderen folgendermassen. Der Centraltheil des Nervensystems findet sich im Schlundring, besonders in der Bruchlinie und am After an derselben Stelle in einem Ganglion. Die Nervenfasern verlaufen vorzugsweise in den Längslinien, ohne jedoch irgendwo zu Strängen zusammenzutreten. Der Schlundring ist ein enger Ring, gerade weit genug, den Pharynx durchtreten zu lassen. Er liegt 2^{mm} hinter der Kopfspitze und steht mit den Seitenwülsten und Medianlinien in innigem Zusammenhange. An drei Stellen sind vorzüglich Ganglienkugeln eingelagert, an der Stelle der beiden Seitenlinien und der Bauchlinie, und zwar wird an letzterem Orte durch Ganglienkugeln eine ansehnliche dreieckige Verdickung

Bauchganglion gebildet. Die Ganglienzellen finden sich besonders an der dem Pharynx zugekehrten Fläche und man erkennt bei den meisten derselben 2 Ausläufer, welche fast alle in den Schlundring übertreten. Die Anordnung des peripherischen Nervensystems ist schwieriger zu verfolgen, doch kann man einzelne Fasern, in den Seitenlinien sowohl, als in den Medianlinien eine Strecke weit verfolgen. Dicht vor dem After finden sich in der Bauchlinie wiederum Ganglienzellen mit Ausläufern, welche, obgleich nur von geringer Menge, ein dreieckiges Ganglion bilden. Der Muskelapparat ist, wie überhaupt bei den Nematoden, für einen Parasiten von hoher Entwicklung. Es ist ein Hautmuskelschlauch, welcher fest mit der Subcuticula zusammenhängt, ein cylindrisches Rohr, welches von der Mundöffnung bis zum After reichend reicht und durch die Längslinien in vier Theile getheilt ist. Man kann die Nematoden in Betreff der Muskulatur in zwei Arten theilen, in Platymyariar und Coelomyariar (Schneider). Die Muskulatur der Platymyariar, wozu die kleineren Nematoden gehören, besteht aus rautenförmigen Zellen von kolossaler Grösse. Jedes Muskelfeld hat zwei Längsreihen von Zellen, die diagonal über einander liegen und in beiden Reihen dieselbe Anordnung zeigen; sie stehen auf gleichen Querschnitten und berühren sich mit den ungleichnamigen Seiten. Die beiden Zellenreihen eines Muskelfeldes sind congruent, die beiden anliegenden Felder symmetrisch angeordnet, so dass die Zellen an die Strahlen einer Federkette erinnern. Die Zellen enthalten je einen bläschenförmigen Kern und besitzen eine deutliche Längsstrei-

fung. Die längsgestreifte Substanz nimmt jedoch die äussere Fläche der Zellen ein; der übrige Theil des selben springt in Form eines dünnhäutigen Bläschens die Leibeshöhle vor und legt sich dicht an die Ausserfläche der Eingeweide. Diese Blase enthält Kern und Kernkörperchen, ausserdem eine halbe Flüssigkeit und eine Körnerlage, welche die freie Innenfläche der contractilen Fasersubstanz, sowie die Blasenwand auskleidet. Die grösseren Arten, die Coelomyarier, haben eine wesentlich andere Muskulatur. Die Fleischsubstanz der Zellen hat hier die Form von breiten Platten verloren, sie wandelt sich in Rinnen um, deren Seitenränder mehr oder minder weit von einander abstehen. Die Zellen werden also mehr faserartig. Die diagonale Anordnung ist beibehalten, die Breite bleibt hier aber bedeutend hinter der Länge zurück. Nach den Körperenden hin werden die Muskelfasern schmaler und niedriger. In allen Fällen aber bleibt der Gegensatz zwischen Muskel und Rindensubstanz, am Auffallendsten in der Mitte, wo erstere ein mehr oder minder starkes Polster bildet, das den Zellkern in sich einschliesst und blasenartig in den Leibesraum hineinragt. Zur letzteren Abtheilung gehört auch die *Ascaris lumbricoides*. Die Dicke der Muskelkante beträgt bei ihr gewöhnlich nur $0,03\text{mm}$, die Höhe der Faser ohne Blase $0,35\text{mm}$, doch nimmt diese von der Mitte nach den Rändern der Art ab, dass die Innenfläche der Muskelfelder eben erscheint. Die Muskelblasen sind beträchtlich entwickelt und füllen den ganzen Raum zwischen Darm und Faserschicht aus. Sie sind durch eine membranöse und fibrilläre Binde-

vereinigt und haben eine Dicke von $1,5^{mm}$. Von den Muskelblasen laufen Fasern und Stränge aus, welche in querer Richtung nach den Medianlinien hinziehen und sich dort vermittelst besonderer auf denselben hinziehender Stränge inseriren. Auch an den Darm treten solche Faserzüge, welche dann eine mehr radiäre Richtung einschlagen. (Leuckart l. c. II., p. 23 ff. u. 172 ff.) Wie überhaupt die Helminthen, so nimmt auch unsere *Ascaris lumbricoides* ihre Nahrung durch die Haut auf, doch ist dies nicht der einzige Weg, sie besitzt auch einen Digestionsapparat. Letzterer bildet ein Rohr, welches vom Mund bis zum After verläuft. Der Mund nimmt das vordere Körperende ein und besitzt drei Lippen, welche einen knopfförmigen Aufsatz von ansehnlicher Grösse bilden, der durch eine tiefe Ringfurche gegen den übrigen Körper abgesetzt ist. Die drei Lippen sind von gleicher Grösse und stellen je einen soliden dreieckigen Zapfen dar, welcher an der Basis mit dem übrigen Körperparenchym zusammenhängt. Die Innenfläche der Lippen berührt sich fast in ganzer Ausdehnung; ihre Aussenfläche ist mit einem scharfen, fein gezähnelten Rande versehen. Da nicht nur der ganze Lippenapparat, sondern auch jede einzelne Lippe an der Basis ringförmig geschnürt ist, da ferner auch die von den Seitenflächen der drei Lippen gebildeten drei Längskanten ausgerandet sind, so entstehen hierdurch vier Zuleitungsröhren, drei an der Basis, eine in der Achse des Lippenapparates, welche mit dem Oesophagus im Zusammenhang stehen und so dem Wurm auch bei geschlossenen Lippen die Nahrungsaufnahme ermöglichen.

Der Zusammenhang zwischen Zuleitungsröhren und Oesophagus insofern nur indirect, als sich der untere Lippenrand der Mundhöhle, nach Aufnahme der drei Interlabialröhren in einen konischen Fortsatz auszieht, welcher trichterförmig in den Anfangstheil des Darmes hineinragt und nur durch eine enge Oeffnung damit in Verbindung steht. Die Längsfasern des Hautmuskelschlauches setzen sich in die Lippen fort und ermöglichen es, dass dieselben wie die Arme einer Kugelzange auseinander weichen und sich wieder nähern können. Darmzotten, Chymustheilchen u. s. w. werden ergriffen und festgehalten. Einen Saugnapf aber, wie das Küchenmeister (l. c. I., p. 327) behauptet, repräsentiren sie nicht, denn auch bei der stärksten Zusammenziehung der Retractores kann die gezähnelte Firste sich nicht über den äussern Rand der Lippenbasis, respective deren Verlängerung bewegen, so dass der Spielraum der Bewegung also höchstens $35-40^{\circ}$ beträgt (Leuckart l. c. II., p. 178). Die Muskeln nehmen nicht die ganze Breite der Lippen in Anspruch, sondern sammeln sich gleich Anfangs in zwei seitliche, durch einen ansehnlichen Zwischenraum getrennte Bündel. Das eine dieser Bündel steigt in membranöser Ausbreitung dicht unter der Aussenwand empor, das andere lenkt nach Innen ab und schlägt die Richtung nach dem gezähnelten Rande ein. Letzteres sind die Retractores, das hahnenkammartige Gebilde Küchenmeisters (l. c. I., p. 327). Als Antagonist wirkt ein Faserzug, der von der Mitte der Aussenwand geraden Wegs nach dem innern Basalrande hinläuft, dessen Richtung also diejenige der Retractores

unter rechtem Winkel schneidet. (Leuckart l. c. II., p. 179). Die Lippen sind mit Tastpapillen ausgestattet, und zwar besitzt die dem Rücken des Wurmes entsprechende deren zwei, während die beiden andern nur je eine haben. Dieselben sind Doppelbildungen, aus einer grössern und einer dicht daneben stehenden kleinern zusammengesetzt. Leuckart ist es gelungen einige Nervenfasern bis in dieselben zu verfolgen (l. c. II., p. 32). Der auf den Mund folgende Darm lässt sich in drei Abschnitte theilen: den Oesophagus, den Chylusdarm und das Rectum.

Der Oesophagus ist von verhältnissmässig unbedeutender Entwicklung, ein cylindrisches, nach hinten nur wenig verdicktes Rohr von 7^{mm} Länge, $1,3^{mm}$ Querdurchmesser. Sein Lumen hat, mit Ausnahme des oberen Endes, das den Trichter aufnimmt, eine wenig beträchtliche Breite und eine dreistrahlige Bildung. Die Muskelfibrillen sind dicht gedrängt und haben einen radiären Verlauf. Zwischen ihnen bleiben an einigen Stellen mit grobkörniger Substanz gefüllte Zwischenräume. Auf beiden freien Flächen hat der Oesophagus eine strukturlose chitinige Membran, an die sich die radiären Fibrillen inseriren. Die Nahrungsstoffe, die durch die Thätigkeit dieser Muskeln in den Darm übergeführt werden, dürften ausschliesslich flüssiger, oder breiiger Natur sein, worauf auch der Mundtrichter, als Klappe, hinzudeuten scheint. Mächtig entwickelt ist der Chylusdarm, welcher bei grössern Exemplaren bis zu 2^{mm} breit ist und durch die ganze Körperlänge hinzieht. Er ist kein Cylinder, sondern bandartig abgeplattet; seine Seitenränder sind den

Laterallinien zugekehrt. Ein grosser Theil desselben wird von den Genitalröhren unregelmässig zusammengedrückt, während der übrige Theil mit dem Muskelschlauche zusammenhängt und zwar so vollständig, dass die Leibeshöhle zur Obliteration gebracht ist. Der Darm ist bräunlich gefärbt, doch rührt dies nicht von braunem Kothe, den das Thier als Nahrung aufgenommen (Küchenmeister l. c. I., p. 328), sondern von der Epithelialbekleidung her. (Leuckart l. c. II., p. 182). Letztere besteht aus Cylinderzellen von 0,14—0,18^{mm} Höhe und 0,001^{mm} Durchmesser, welche zur festeren Verbindung mit der, den Darm an seiner Aussenseite bekleidenden, Tunica propria in besondere Vertiefungen derselben eingepflanzt ist. Auf die Epitheliallage folgt nach Innen noch eine mit Porenkanälen versehene Cuticula. Ein eigentlicher Mastdarm ist nur bei den Männchen vorhanden und auch hier nur von geringer Entwicklung, ein kurzer, enger Kanal mit derber Chitinbekleidung. Beim Weibchen kann man kaum von einem solchen sprechen, man müsste denn das hintere Ende des mit einer Anzahl Längsmuskelfasern hier umsponnenen Chylusdarm so bezeichnen. Bei der weiblichen *Ascaris* stellt der After eine ansehnliche Querspalte dar, mit lippenartig aufgewulsteten Rändern. Die Unterfläche des hinteren Chylusdarmendes trägt zwei ansehnliche einzellige Drüsen von 0,2^{mm}.

Das Blut ist frei in der Leibeshöhle enthalten und nimmt die Spalträume ein, welche zwischen Seitenlinien und Darm frei bleiben. Dasselbe ist körnerlos, hell und hat einen starken Eiweissgehalt. Schwefel-, Chlor- und

Kalkverbindungen fehlen in demselben, während phosphorsaure Salze mehrfach vertreten sind (Marcet).

Die Fortpflanzung geschieht auf geschlechtlichem Wege, durch Eier, welche der Einwirkung des Sperma zur Entwicklung bedürfen. Die Organisation der weiblichen und männlichen Organe, welche auf zwei Thiere vertheilt sind, zeigt eine unverkennbare Analogie; es sind gestreckte, vielfach geschlängelte und zusammengefaltete Schläuche von bedeutender Länge und einem Querschnitt, der vom blinden Ende nach der Ausmündungsstelle zunimmt. Der männliche Genitalschlauch mündet in den Mastdarm, bei den weiblichen Thieren ist die Oeffnung in der Körpermitte an der Bauchseite und rückt mit dem Grössenwachsthum des Thieres mehr und mehr nach vorn, bis zur Grenze des vordern Drittels. Die Schläuche liegen unterhalb des Darmes an der Bauchfläche. Die männlichen Geschlechtsorgane bestehen aus einer bei grössern Exemplaren etwa 1200—1500^{mm} langen Röhre, welche aus zwei Schenkeln besteht, deren aufsteigender von der Kloake bis zur Körpermitte sich erhebt, dann sich hakenförmig umbiegt und in den vielfach gewundenen und zusammengefalteten, immer dünner und feiner werdenden, absteigenden Schenkel übergeht. Der bei weitem grösste Theil des absteigenden Schenkels dient zur Entwicklung der Samenkörperchen, fungirt also als Hoden. Derselbe besteht aus zwei dünnen Membranen, einer äussern Tunica propria, an Aussehen und Beschaffenheit der Cuticula vergleichbar und einer innern Epitheliallage, deren Zellen in langgestreckte, kernlose, schmale Fasern von trübem Aussehen, mit

lancettförmigen zugespitzten Enden auswachsen, welche dicht gedrängt neben einander liegen und wulst- oder reifenartig in den Innenraum vorspringen. Im Innern des äussersten Endes der Röhre, des Keimstocks, trifft man ein zähflüssiges Protoplasma mit zahlreichen, bläschenförmigen Kernen, die in reger Theilung begriffen sind. Tritt dieses Protoplasma in die eigentliche Samenröhre über, so beginnt eine Klüftung, wodurch es in einzelne Ballen zerfällt, die je ein Bläschen einschliessen. Die Ballen ordnen sich, indem sie zugleich eine Kugelform annehmen, radiär um einen durch die Hodenröhre verlaufenden Achsenfaden, eine Rhachis, mit welcher sie durch je einen dünnen Fortsatz verbunden sind. Solcher Rhachiden sind in der Hodenröhre 16—20 vorhanden (Leuckart l. c. II., p. 80 ff.) Treten die Samenkörperchen tiefer in die Hodenröhre ein, so lösen sie sich von ihrer allmählig dünner gewordenen Rhachis und nehmen eine Kugelform an. Im obern Theile des letzten Hodenabschnitts, des sogenannten Samenleiters, welcher gegen 100^{mm} misst, angekommen, gehen diese Samenzellen einen Klüftungsprozess ein, sie zerfallen zunächst in zwei, dann in vier Theile von kugliger Form, die eigentlichen Samenkörperchen. Im Innern der weiblichen Organe, der sogenannten Samentasche gehen sie noch eine Veränderung ein: sie verlieren ihre grobkörnige Beschaffenheit und nehmen ein helles Aussehn an, namentlich in der Peripherie. An dem einen Segmente lässt sich allmählig ein heller Ueberzug unterscheiden, der der übrigen Masse zuerst wie eine Kappe aufsitzt, sich dann aber kugelförmig erhebt und zu einem 0,007-–0,009^{mm} hohen und

0,006—0,007^{mm} Zapfen wird. (Leuckart l. c. II., p. 82 ff.) Dieser Zapfen entsteht aus dem Kerne (Munk), ist hohl und sein Innenraum ist mit dem übriggebliebenen Theile der Samenkörperchenmasse angefüllt, welche als mehr oder minder grosser Ballen daraus hervorquillt und mitunter den ganzen Kegel in sich einhüllt. Mit dieser Masse hängen die Körperchen auf den Epithelien der Samentasche und führen amöboide Bewegungen aus, indem die Protoplasmamasse bald nach dieser, bald nach jener Richtung hin Fortsätze ausschickt. Der Hoden setzt sich in die Samenblase fort, einen geraden Kanal von 60—70^{mm} Länge, welcher im oberen Theile 2^{mm} Querdurchmesser hat, sich aber nach untenhin verjüngt. Die Tunica propria ist dicker, als diejenige des Hoden und die in Buckeln und Zapfen vorspringende Epitheliallage hat einen dichten Besatz von dünnen, mehrfach gespaltenen Fäden, die bis zu 0,8^{mm} Höhe in den Innenraum hineinragen, sich während des Lebens verlängern und verkürzen und so die Weiterbewegung der Eier vermitteln. Nach hinten zu verkürzen sich die Fäden mehr und mehr, dagegen wachsen die Zapfen in keulenförmige Zotten aus. Die Uebergangsstelle in den letzten Theil, den Ductus ejaculatorius, welcher 7—8^{mm} misst, ist merklich verengert und mit einer ringförmigen, sphincterartigen Muskulatur umgeben. Auch der Ductus ejaculatorius ist mit einer Muskulatur ausgestattet und zwar mit einer dünnen Lage Ringfasern und mit Längsfasern, die theils in der Tiefe, theils oberflächlich zwischen den Ringfasern verlaufen. Durch Verkürzung und Verengerung des Ductus wird das Sperma ausgetrieben. Die Tunica propria trägt ein Cylinderepithel von be-

trächtlicher Länge ($0,3^{mm}$), welches den Kanal sehr verengert. Der männliche Begattungsapparat wird aus Chitingebilden zusammengesetzt, welche in der Kloake beim Eintritt der geschlechtlichen Reife zur Entwicklung gelangen. Dieser Begattungsapparat besteht aus zwei kräftigen, soliden, wenig gekrümmten Chitinstäben von 2^{mm} Länge, den Spicula, welche auf der Rückenfläche der Kloake gelegen sind und mit ihrem freien konischen Ende eine Strecke weit in den Kloakenraum hineinragen. Der obere Theil der Spicula liegt nicht frei in der Leibeshöhle, sondern steckt in einer Tasche, die sich als eine Ausstülpung der Kloakenwand betrachten lässt und von einer Fortsetzung der den Mastdarm durchziehenden Cuticula ausgekleidet ist. Zu ihrer Bewegung dienen zweierlei Muskeln, welche sich an das Wurzelende ansetzen und von da auf der Chitinwand der Tasche theils nach abwärts laufen, protrahentes, theils in entgegengesetzter Richtung nach den Körperwänden emporsteigen, retrahentes. Das männliche Hinterleibsende ist stark hakenförmig nach dem Bauche umgebogen. So weit die Krümmung reicht, ist die Bauchfläche des Schwanzendes von zahlreichen Querfalten durchzogen. An jeder Seite der Bauchfläche stehen gegen 70 Gefühls papillen, welche bei der Begattung jedenfalls die Friction erhöhen und so eine innigere Berührung bewirken. Sie sind nach hinten dichter zusammengedrängt, am dichtesten in der Nähe der Geschlechtsöffnung. Dicht hinter letzterer trifft man einige Zwillingspapillen, welche bis $0,04^{mm}$ messen, während die einfachen zum Theil weniger, als $0,014^{mm}$ im Durchmesser haben.

Die weiblichen Genitalorgane sind noch bedeutender entwickelt, als die männlichen und bestehen aus zwei Röhren, deren jede die Hodenröhre an Länge übertrifft, da bei Weibchen von 280^{mm} jede Röhre schon beinahe 500^{mm} misst. Daher kommt es auch, dass die Weibchen die männlichen Thiere an Dicke übertreffen. Die Geschlechtsöffnung ist bei grössern Exemplaren fast genau am hintern Ende des vorderen Körperdrittels, eine kleine Querspalte mit aufgeworfenen Rändern links neben der Bauchlinie. Die Genitalschläuche lassen drei Abschnitte unterscheiden: eine unpaarige Vagina und einen paarigen Uterus und Eierstock. Die Vagina ist der kürzeste Abschnitt, ein enger Kanal von 6^{mm} Länge, der von der Geschlechtsöffnung direkt nach vorn verläuft, um dann scharf einzuknicken und in den konischen Anfangstheil des Uterus überzugehn. Die Uteri sind ein paar Schläuche von $150—200^{mm}$ mit durchschnittlicher Weite von $1,5$ bis $1,7^{mm}$. Der Innenraum beträgt gegen $900—1000^{cm}$ mit $10—11$ Millionen Eiern (vergl. Leuckart l. c. II., S. 198 ff.) Die Uteri liegen dicht auf der Bauchwand neben einander und verlaufen ziemlich gestreckt nach hinten, bis sie in einiger Entfernung vom Afterrande umliegen und in den fadenförmig dünnen Ovarialtheil übergehen. Das untere Ende des Ovarium fungirt als Samenscheide, hat im gefüllten Zustande die doppelte Dicke des Ovarium und eine Länge von 16^{mm} . Das Ovarium ist vielfach gewunden, steigt bis zur Vaginalöffnung empor, zieht dann wieder auf dem Uterus nach hinten, um in immer kürzeren Schlingen noch einige Male auf- und abwärts zu laufen und schliesslich in einem verschlun-

genen, dünnen Faden zu endigen. Das Ovarium hat eine Länge von 1200^{mm} und besitzt dieselbe Bildung, wie der Hoden, nur dass es Eier statt der Samenkörperchen enthält. Die letzten 80^{mm} des Ovarium, welche auch als Tuba bezeichnet werden, sind mit Ringmuskelfasern um die Tunica propria versehen, welche nach der Samentasche zu immer dichter werden. Das faserartige Epithel des oberen Ovarialtheils hat kurzen rautenförmigen Zellen Platz gemacht, welche immer weiter in den Innenraum vorspringen und schliesslich, wie in der männlichen Samenblase zu keulenförmigen Zotten sich gestalten. In der Samentasche sind diese, anfänglich distal stehenden, Zotten durch ansehnliche Distanzen getrennt und haben das Ansehen dreieckiger, parallel geordneter Lamellen. Die Oberfläche letzterer ist mit Samenkörperchen besetzt und ebenso enthält der Innenraum der Tasche Samenkörperchen. Die Wandung des Uterus enthält Ringfasern und Längsfasern, welche nach der Scheide an Dicke zunehmen. Das Epithel zeigt zahlreiche Buckel und Zapfen, die auf einer körnigen Unterlage sitzen. Die Scheide enthält statt der Zotten schmale Längsfalten, die hier mit einer dicken, glasigen Cuticula bekleidet sind. Die erste Entwicklung der Eier zeigt keine Unterschiede von der der Samenkörperchen. Sie geschieht auch hier in dem blinden Ende des Ovarium, dem Keimstock, woselbst man in gleicher Weise ein zähflüssiges Protoplasma mit Kernen antrifft. Schon im untern Theile des Keimstocks hat die zähe Substanz zwischen den Kernen an Masse zugenommen; die Masse beginnt jetzt in einzelne Ballen zu zerfallen, die je einen Kern ein-

hliessen und sich immer schärfer gegen einander ab-
 tzen. Letztere üben eine so grosse Pression auf ein-
 der aus, dass sie förmliche Scheiben bilden, die sich
 er verdicken, je tiefer sie in die Eiröhre hinabsteigen
 d zugleich eine dunkle Beschaffenheit annehmen, bis
 e schliesslich zu ovalen Körpern werden, die jedoch
 ne selbstständige Hüllhaut sind. Diese Eikeime liegen
 er nicht in einfacher Reihe neben einander, sondern
 d zu 6—10—20 um eine gemeinsame Rhachis grup-
 rt und mit ihr verwachsen. Diese Rhachis verläuft,
 t Ausnahme des Keimfaches, durch das ganze Ova-
 um und verdünnt sich im untern Theile, je mehr die
 er sich entwickeln, bis sie schliesslich ganz verschwindet,
 euckart l. c. II., p. 76 ff.) Nach Meissner (vergl.
 ickenmeister l. c. I., p. 345 ff.) ist der Entwicklungs-
 rgang ein etwas anderer. Die im Keimfache entste-
 nden Zellen, die Mutterzellen, liegen in einfacher Reihe
 er einander und lassen nach ihrem Uebertritt in die
 entliche Ovarialröhre die Tochtereier in Traubenform
 vorknospen. Dadurch, dass die Mutterzellen eng auf
 ander liegen entsteht das Bild eines zusammenhän-
 nden Achsenfadens. Die Eier, welche aus der Samen-
 che in den Uterus übertreten und dort befruchtet
 d, sind noch ohne Schale, oval, grobkörnig mit einem
 sssten Durchmesser von $0,05^{mm}$. Auf ihrer Oberfläche
 ft man nicht selten Samenkörperchen an. Die Schale
 d von dem Sekrete der Uteruswandungen geliefert
 eissner) und zeigt eine Schichtung in zwei Mem-
 nen, deren untere die festere ist. In der vorderen
 lfte des Uterus schlägt sich auf die Schale eine Ei-

weiss-schicht nieder, die sich alsbald in Buckeln erhob und den Eiern ein sehr charakteristisches Ansehen verlieh.

Die Fruchtbarkeit der Spulwürmer ist sehr gross, indem die Gesamtzahl der jährlich producirten Eier auf etwa 60 Millionen veranschlagt werden kann (Eschscholtz). Die nach Aussen abgelegten Eier zeigen noch keine Spur von Embryonalentwicklung. Letztere ist zuerst von Schubart weiter verfolgt worden, welcher die Eier in Wasser cultivirte und nach Verlauf mehrerer Monate die Embryonalentwicklung vollendet sah. Die Entwicklungsdauer unterliegt verschiedenen Schwankungen und wird von der Temperatur in hohem Grade beeinflusst, während sie im Winter fast gar keine Fortschritte macht. Selbst im warmen Zimmer, sah Leuckart (l. c. II. p. 209 ff.) im Hochsommer mitunter schon nach 14 Tagen völlig ausgebildete Embryonen. Die Eier entwickeln sich sowohl im Wasser, als in feuchter Erde und feuchter Atmosphäre; Austrocknen schadet ihnen nicht, sie behalten vielmehr durch Wasserzusatz ihre Entwicklungsfähigkeit wieder und auch Frost vertragen sie ziemlich gut, doch hemmt derselbe ihre Weiterentwicklung. In Urin und in künstlich hergerichteten Senkgruben konnte ihre völlige Entwicklung nicht erreicht werden. (Leuckart l. c. II., p. 211 ff.)

Bei beginnender Entwicklung verdichtet sich die Dottermasse, der Kern verschwindet, doch hellt sich das Centrum alsbald wieder auf und ein neues Bläschen zeigt sich in demselben, dem früheren zum Verwechseln ähnlich. Dasselbe wächst in die Länge, schnürt sich dann der in Aequatorialrichtung zusammen und zerfällt

rei kleinern Bläschen, die bald auseinander rücken und
 n welche sich die Dotterkörner gruppieren, so dass zwei
 trennte Hälften, jede mit einem Bläschen in der Mitte,
 t stehen. Die Klüftung wiederholt sich, wodurch die
 allen auf vier steigen, dann auf 6, 8, bis schliesslich
 er zerklüftete Dotter eine Maulbeerform annimmt. Jetzt
 ellt sich der eine Eipol auf und zwar immer derjenige,
 o das spätere Kopfbende sich bildet. Der Dotter streckt
 ch zugleich in die Länge und bald beginnt sich der
 armkanal zu differenzieren, indem sich die in der Längs-
 hse des Embryonalkörpers hinlaufende Zellensäule gegen
 e periphere Lage absetzt. Der Darmkanal ist An-
 gs solide, doch nimmt er bald die spätere Röhren-
 m an. Nachdem Darm und Körperwand differenzirt
 nd, vertauscht der Wurm seine bisherige plumpe Form
 it einer cylindrischen, indem der Längsdurchmesser auf
 osten des Querschnitts immer mehr zunimmt. Zugleich
 ümmt sich der Körper im Innern des Eies zusammen,
 dem das Schwanzende sich nach der Bauchfläche um-
 egt, allmählig zum Kopfe emporsteigt und sich von da
 eder nach abwärts begiebt. Die ausgebildeten Em-
 yonen sind cylindrische Würmer von $0,3^{mm}$ Länge und
 em Durchmesser von $0,014^{mm}$. Der Oesophagus hat
 e bedeutende Länge, er misst $\frac{1}{3}$ des gesammten Kör-
 rs; der Chylusdarm markirt sich deutlich durch seine
 ben Fettkörner. Statt der klappenförmigen Lippen
 gt das abgerundete Kopfbende an der Bauchseite einen
 inen Bohrzahn. Die Cuticula ist dünn und einfach
 d nicht selten trifft man Exemplare in der Häutung.
 e wir sehen, ist der Embryo von dem ausgebildeten

Thiere sehr verschieden; wie jedoch diese Unterschiede ausgeglichen werden, ist bis jetzt noch unbekannt. Die bis jetzt beim Menschen aufgefundenen kleinsten Spulwürmer erscheinen den Embryonen gegenüber als wahre Riesen. So erwähnt Küchenmeister (l. c. I., p. 23) einen Wurm, dessen Grösse gegen 2 Zoll betrug und der noch geschlechtlich unreif war; Vix beobachtete einen Spulwurm der nur 20^{mm} lang, $0,5^{mm}$ breit war. Laennec erwähnt einen Fall, in dem der Magen und die Gallengänge eines Kindes von Spulwürmern erfüllt waren, die von 6'''—5'' massen; Leuckart (l. c. II., 218 ff.) hatte zweimal junge Spulwürmer zu untersuchen Gelegenheit, von denen das eine Exemplar 85^{mm} lang war, das andere nur die Hälfte mass. Alle diese Thiere soweit sie wenigstens näher untersucht worden sind hatten schon ein mehr oder minder entwickeltes Genitalsystem und, bis auf eine schlankere Körperform und bedeutendere Länge des Schwanzes, die Gestalt der ausgewachsenen Spulwürmer. Die Frage nach den ersten Schicksalen des menschlichen Spulwurms können wir nur an der Hand der Analogie und Induction erörtern. Die *Ascaris mystax*, welche mit der *Ascaris lumbricoides* nahe verwandt ist, durchläuft ihre ganze Metamorphose im Darm der Katze; ihre Embryonen wandern als kleine Würmer von $0,4^{mm}$ ein, leben bis zu einer Grösse von $1,5$ — 2^{mm} im Magen, treten dann in den Dünndarm über, häuten sich bei einer Länge von $2,8^{mm}$ und erlangen hierbei den charakteristischen Lippenapparat. Zugleich beginnt die Geschlechtsentwicklung, wobei die Thiere unter steter Grössenzunahme allmählig die definitive B

ung erlangen. Auf ähnliche Weise könnte ja auch die
 entwicklung unserer *Ascaris* vor sich gehen. Die em-
 byonenhaltigen Eier, die bei der grossen Häufigkeit des
 Spulwurms ja überall verbreitet sein müssen, da sie ihrer
 Kleinheit wegen leicht überall hin verschleppt werden,
 könnten ja mit den Speisen in den Darm des Menschen
 gelangen und dieser so mit der *Ascaris lumbricoides* in-
 fectirt werden. Feld und Garten, Haus und Hof würden
 vielfache Gelegenheit zur Ansteckung liefern; auch durch
 die Communication unserer Brunnen mit benachbarten
 Bächen können die *Ascaris*-Eier in das Trinkwasser ge-
 langen (Mosler) und uns so den Spulwurm liefern. Die
 Annahme, dass es die Eier sind, welche uns mit Spul-
 wurmern inficiren, gewinnt noch an Wahrscheinlichkeit,
 wenn wir bedenken, dass es gerade Kinder und Land-
 wohner sind, die von diesem Parasiten am meisten be-
 troffen werden, da ja gerade diese durch den Genuss
 von vegetabilischer Nahrungsmittel und durch Unrein-
 lichkeit am meisten einer Uebertragung Vorschub lei-
 sten. Doch die angestellten Experimente haben ein ganz
 negatives Resultat geliefert. Küchenmeister (l. c. II.,
 482) verlor sein Versuchsthier, einen Hund, aus den
 Fäces; Leuckart (l. c. II., p. 221) fand bei einem Hunde
 und einem Kaninchen, die er zehn, respective vierzehn
 Tage nach der Fütterung untersuchte, keine Weiterent-
 wicklung der Embryonen. Doch dies waren vielleicht
 nicht die geeigneten Versuchsthier. Allein Davaine,
 welcher an einem Rinde experimentirte, welches ja gleich-
 falls ein Träger unserer *Ascaris* ist und demselben viele
 embryonenhaltige Eier zuführte, fand bei der 4 Wochen

nachher vorgenommenen Section auch nicht einen Spurwurm und nicht besser erging es später Leuckart (l. c. II., p. 222) mit einem Schweine. Mosler stellte eine Reihe von Versuchen am Menschen an. Er selbst verschluckte zuerst eine Anzahl embryonenhaltiger Eier und als das Resultat ausblieb, wählte er eine Anzahl kräftiger Kinder verschiedenen Alters, denen er Anfangs 1 bis 18 Eier, später mehrere Dutzend gab, doch auch hier immer mit demselben negativen Erfolge. Auch Leuckart hat gegen 100 Eier verschluckt ohne Beschwerde, aber auch ohne Würmer zu erzielen und behauptet deshalb, gestützt auf diese Versuche, mit Recht, dass die Uebertragung auf andere Weise, als durch embryonenhaltige Eier geschehen müsse. (l. c. II., p. 223 ff.) Es bleibt nur noch ein doppelter Weg übrig. Entweder fallen die Embryonen aus ihrer Schale und leben ohne Veränderung ihrer Grösse und Form eine Zeit lang im Freien, oder sie durchwandern einen Zwischenwirth und treten mit diesem in den Menschen über. Die erste Möglichkeit ist weniger wahrscheinlich. Schon der Bau der Embryonen ist anders, als das sonst bei frei lebenden Nematodenembryonen der Fall ist; weit wichtiger noch ist der Umstand, dass die Embryonen auch nach erlangter Reife in ihren Schalen verharren, während doch sonst die in der Jugend frei lebenden Helminthen nach Abschluss der Embryonalentwicklung nach Aussen hervorschlüpfen. Doch beide Einwürfe sind nicht direkt beweisend und der letzte könnte ja auch dadurch paralytisch werden, dass die Eier von einem Thiere verschluckt, die Schale aufgelöst und die freien Embryonen na-

Aussen abgesetzt würden, wie das Davaine bei Versuchen mit Ratten beobachtet hat. Derselbe fand bei Ratten, welche er mit Spulwurmeiern gefüttert hatte, theils freie Embryonen im Dünndarm, theils beobachtete er sie beim Ausschlüpfen, theils endlich fand er sie in den Excrementen vor. Vielleicht könnten ja die Embryonen auf solche Weise ihre Freiheit erlangen und dann doch noch später in den menschlichen Darm einwandern. Die von Leuckart in dieser Richtung angestellten Untersuchungen mit Mäusen und Hunden haben kein Resultat gehabt. Mäuse und junge Hunde liessen die Eier unverändert den Darm passiren, während ein erwachsener Hund Schale und Embryonen vollständig verdaute. Obgleich nun letzterer Umstand nicht gerade schlechtweg gegen diese Uebertragungsweise spricht, so dient er doch auch nicht zu ihrer Empfehlung und um so grösseres Gewicht gewinnt die Möglichkeit der Uebertragung durch einen Zwischenwirth, besonders deshalb, weil die Embryonen gewisser Ascariden z. B. *Ascaris acus*, (die ihre Jugendform in den Mesenterialhäuten und der Leber des Weissfisches verlebt) bei verschiedenen Thieren einen Zwischenzustand durchmachen. Die *Ascaris*-arten haben ihre Zwischenwirthe bei den verschiedensten Thieren, bei Fischen, Fröschen, Maulwürfen, Regenwürmern. Bei welcher Thierart der *Ascaris lumbricoides* nun zu suchen sein möchte, ist ungewiss, doch vermuthet Leuckart (l. c. II., p. 228 ff.) ihn bei den niedern Thieren, da ihm das Vorkommen des Spulwurms gegen ein höheres Thier als Zwischenwirth zu sprechen scheint. Die Experimente mit Käferlarven,

Regenwürmern, Mehlwürmern und Kellerasseln haben zu keinem Resultate geführt, denn von allen diesen Thieren wurden die Eier verschmäht; die Wasserasseln und andere Wasserbewohner suchten die Eier zwar mit grosser Begierde auf, liessen sie aber wieder unverdaut abgehen. Dieses negative Resultat spricht keineswegs gegen die letztere Annahme und bei weiteren Experimenten mit anderen Thieren wird ein positives Resultat wahrscheinlich nicht ausbleiben.

Die *Ascaris mystax*, der Katzenspulwurm, ist einige Male beim Menschen angetroffen worden. Zuerst erwähnt ihrer Bellingham im Jahre 1839, unter dem Namen *Ascaris alata*, dann Coblod im Jahre 1863 und Leuckart im Jahre 1861 (l. c. II., p. 260.) Die *Ascaris marginata* des Hundes und die *Ascaris triquetra* des Fuchses lassen sich von ihr nicht unterscheiden. Die *Ascaris mystax* ist kleiner und dünner, als der gemeine Pulwurm und von ziemlich gleichmässiger Cylinderform. Das Weibchen ist nur selten über 120^{mm} lang und 1,7^{mm} dick, während das Männchen gewöhnlich eine Länge von 45—60^{mm}, eine Dicke von 1^{mm} besitzt. Die Cuticula ist im Allgemeinen der der *Ascaris lumbricoides* analog, nur ist das Corium in so fern verschieden, als mit beiden Flächen desselben, innerer wie äusserer, dicht auf einander folgende, 0,012^{mm} breite Quersfurchen bestehen. Die Zähne der Lippenränder sind verhältnissmässig gross, sie messen 0,004^{mm} in der Mitte, nehmen aber nach den Lippenwinkeln allmählig ab. Der Bau der Lippen ist, bis auf die schlankere Form und die etwas abweichende Gestalt der von Muskelfasern durchzogenen Pulpa,

dem der *Ascaris lumbricoides* anfallend ähnlich. Hinter dem Kopfbzapfen erheben sich zwei flügel förmige Leisten von chitiniger Beschaffenheit, die an den Seitentheilen des Körpers, 2—4^{mm} lang, hinlaufen und eine umgekehrte Herzform besitzen. Diese sogenannten Kopfflügel sind blosse Duplikaturen der äusseren Cuticular-Bedeckungen, deren erste Spur man schon in geraumer Entfernung vom Kopfe in Form eines glatten Chitinstreifens erkennt, der sich an der Seitenlinie auf die Faserschichten des Corium auflagert. Die äussern Lagen der Cuticula werden durch die Erhebung der Firsten nicht unterbrochen, sie bilden deren Ueberzug und die Ringelung der Cuticula sammt den Balken setzt sich auf sie fort. Der scharfe Rand der Flügel ist ein festes Chitinband, das mit seinem Aussenrande der Epidermis verbunden ist und eine Strecke in die Innenmasse hineinragt. Die Bildung des Darmkanals hat grössere Eigenthümlichkeiten. Es schiebt sich nämlich zwischen Pharynx und Chylusdarm ein kleiner Drüsenmagen ein, welcher sich gegen beide gleichmässig absetzt. Er ist ein kugliger Abschnitt von höchstens 0,8^{mm} Durchmesser, liegt auf gleicher Höhe mit den Enden der Kopfflügel und seine Wandungen enthalten 4—6 grosse Kerne, die mit reichlicher Körnermasse die Zwischenräume zwischen den spärlichen Muskelzügen ausfüllen. Sein Lumen ist ziemlich weit, doch prismatisch. Der Chylusmagen hat eine mehr cylindrische Form, doch gilt dies zunächst blos für die Aussenwand, da der Innenraum nur im Anfangstheil eine grössere Geräumigkeit besitzt, sonst aber eine enge, horizontal hinziehende Spalte bildet. Die Cylinderform

des Darmes ist bedingt durch die Weite der Bauchhöhle, welche nur unvollständig von den Eingeweiden ausgefüllt ist, da die Muskelblasen sich überall auf eine dünne Lage beschränken. Im Uebrigen ist die Muskulatur in ihrem Verhalten übereinstimmend mit der der *Ascaris lumbricoides*, ebenso, wie es scheint, das Nervensystem. Die Seitenlinien sind niedriger und ragen nicht über die Muskulatur hervor.

Die Windungen der Genitalröhren reichen viel weiter nach vorn als bei *Ascaris lumbricoides*; auch die anatomische Bildung und der histologische Bau zeigt Verschiedenheiten in den einzelnen Abschnitten.

Zunächst ist die Samenblase bei den Männchen colossal entwickelt, ein ansehnlicher Kanal von der Dicke des Darmes, welcher über die Mitte des Körpers emporragt, sich nach hinten allmählig verjüngt, aber 3—4^{mm} vor der Kloakenöffnung sich wieder auf das Doppelte verdickt (ductus ejaculatorius).

Die fadenförmige Hodenröhre, welche auf das obere Ende der Samenblase folgt, bildet zunächst eine ziemlich tiefe, rückwärts laufende Schlinge, wendet sich dann aber mit vielen zickzackförmigen Windungen nach vorn, bis sie in einer Entfernung von etwa 6^{mm} hinter der Kopfspitze wieder umbiegt und nach unregelmässigem Verlauf 12—14^{mm} hinter dem vorderen Körperende aufhört. Der Hoden ist also fast ausschliesslich auf die vordere Körperhälfte beschränkt und hat eine Länge, welche das Fünffache der Körperlänge beträgt. Die Samenblase hat ein Epithel von membranlosen fest verklebten Körnerzellen, deren Enden zapfenförmig in den

Innenraum ragen. Die Entwicklung der Samenelemente ist dieselbe, wie bei *Ascaris lumbricoides*, nur ist die Zahl der Rhachiden geringer.

Die Zahl und Anordnung der Analpapillen ist ähnlich wie bei *Ascaris lumbricoides*. Auch hier unterscheidet man jederseits fünf postanale Papillen, nur sind die zwei letzten nicht immer einfach und zu den drei Schwanzpapillen kommt noch eine vierte hinzu. So weit die Schwanzpapillen reichen, etwa 6^{mm} ist das männliche Hinterleibsende spiralig eingerollt.

Die Spicula sind sehr charakteristisch, nicht blos durch Länge und schlanke Form des bogenförmig gekrümmten Schaftes, sondern namentlich durch die Anwesenheit zweier divergirender Längsleisten, welche der Concavität derselben in ganzer Länge aufsitzen und die Begattungsorgane zu förmlichen Rinnen machen. Die Länge der Spicula ist 3^{mm} , ihre Dicke nur $0,03^{mm}$. Die Vulva liegt ziemlich in der Mitte der vordern Körperhälfte. Der Uterus ist nur kurz, selten über 40^{mm} , was um so auffallender ist, als der durch Verwachsung der beiden Uterushörner entstandenen Körper gewöhnlich zwei Dritttheile dieser Länge einnimmt. Die Vagina misst nur $3-4^{mm}$. Je kürzer aber diese beiden Theile sind, desto länger ist die Samenblase: $18-24^{mm}$, deren unteres Ende ausserdem beutelförmig erweitert ist. Die Länge der Eiröhren ist beträchtlich, 170^{mm} eine jede. Die erste Umbiegung der weiblichen Geschlechtsröhren fällt in den Anfangstheil der Samenblase und zwar geschieht dieselbe so früh, dass noch ein ganzes Körperdritttheil nach hinten übrig bleibt, welches dann bis zur

Schwanzspitze von den Windungen des Eierstocks ausgefüllt wird. Die vordere Umbiegungsstelle reicht weit über die Geschlechtsöffnung hinaus, so dass bei den grössern Exemplaren nur der vom Pharynx durchsetzte Theil der Leibeshöhle von den Genitalien frei bleibt. Der Bau der Geschlechtströhren ist im Uebrigen wie bei *Ascaris lumbricoides*; auch die Entwicklung der Eier geschieht auf dieselbe Weise, nur die Zahl der Eikeime im Umkreise der Rhachis ist ungleich geringer. Die reifen Eier sind kuglig und grösser, als bei *Ascaris lumbricoides*: $0,070^{mm}$. Die Stelle der Eiweissbeutel auf der Aussenfläche ist von einem System netzartig verbundener Stränge vertreten, deren Maschenräume als Grübchen erscheinen. Die abgelegten Eier der *Ascaris mystax* zeigen noch keine Spur von Embryonalentwicklung; dieselbe geht vielmehr erst später vor sich und unterscheidet sich nicht von der der *Ascaris lumbricoides*. Nur die Entwicklungsdauer ist im Allgemeinen eine kürzere: sie nimmt im Sommer 4.—10 Wochen, im Winter aber mehrere Monate in Anspruch. Der reife Embryo ist dem der vorigen *Ascaris*-art ausserordentlich ähnlich, nur grösser, $0,36 - 0,42^{mm}$; ein Drüsenmagen ist noch nicht vorhanden. Die Lebensdauer der Embryonen in der Eihaut, welche bei *Ascaris lumbricoides* bis mehrere Jahre beträgt, übersteigt bei unserer *Ascaris* nur selten einen Zeitraum von 6—10 Monaten (Leuckart l. c. II., p. 277). Die Schicksale der jungen Brut, bis zur Uebertragung in den definitiven Wirth, sind noch unbekannt. Man weiss nicht, ob sie einen Zwischenwirth durchwandert, oder ob sie mit der Eihülle

direkt in den definitiven Wirth gelangt, nur so viel steht fest, dass die *Ascaris mystax* als Embryo, ohne eine Weiterentwicklung erlangt zu haben, in den definitiven Träger gelangt. Leuckart (l. c. II., p. 280 ff.) fand nämlich im Magen eines 8 Wochen alten Kätzchens 40 bis 60 Nematodenembryonen, die zum Theil nur 0,4 bis 0,6^{mm} massen und unzweifelhaft der *Ascaris mystax* angehörten, da er auch im Dünndarm des Thieres grössere Embryonen und junge Spulwürmer von 3—4^{mm} antraf und da ausserdem diese Embryonen in allen Stücken der aus den Eiern gezogenen Brut glichen. Wie die Thiere in die Katze gelangt waren, war nicht nachzuweisen, nur war so viel mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit festzustellen, dass, wenn die *Ascaris mystax* einen Zwischenträger hat, dieser wohl nicht unter den grösseren Thieren zu suchen sein wird. Nachdem die Würmer bei einer Grösse von 1,3—1,8^{mm} in den Dünndarm übergetreten sind, häuten sie sich, nehmen die Kopfbildung der *Ascariden* an und fangen an sich geschlechtlich zu differenziren, indem die bis jetzt bohnenförmige Genitallage, welche in der Mitte des Chylusdarms an der Bauchseite gelegen ist, in die Länge wächst. Schon bei 2,8^{mm} Länge kann man Männchen und Weibchen unterscheiden; Entwicklung und Wachsthum geht ziemlich rasch vor sich, da man schon bei Hunden von 5—6 Wochen Spulwürmer von 50—100^{mm} antrifft.

Die *Oxyuris vermicularis* war schon Hippocrates und Galenus unter dem Namen *Ascaris* bekannt, doch kannten diese und auch die spätern Naturforscher nur die grösseren Weibchen, während die Männchen erst

von Soemmering entdeckt und von Bremser zuerst beschrieben sind. Diese Entdeckung wurde bald wieder angezweifelt. da viele Forscher und unter ihnen auch Siebold die Männchen nicht aufzufinden vermochten; doch gelang es bald darauf Zenker nachzuweisen, dass dieselben gar nicht so selten und leicht aufzufinden sind. Man findet sie nach Letzterem (vergl. Küchenmeister l. c. I., p. 283), wenn man den Schleim mit dem Scalpellstiel von den Wänden des Dickdarms abstreift und diesen unter dem Mikroskope, oder auch ohne dasselbe untersucht, vorzüglich dann, wenn der Dickdarmkoth durch Diarrhoeen weggespült ist. Die Länge des ausgewachsenen Weibchens ist 10^{mm} , die grösste Dicke etwa $0,6^{mm}$; die schlankeren und kleineren Männchen messen gewöhnlich gegen 4^{mm} in Länge, $0,16—0,17^{mm}$ in Dicke.

Die Cuticula ist derb, elastisch und farblos; sie hat eine Dicke von $0,005—0,006^{mm}$, ist geringelt, doch sind die Ringel nur von geringer Breite und wenig gegen einander abgesetzt. Der Bau der Cuticula ist nur wenig von dem der Ascariden verschieden, nur sind die einzelnen Schriften, gemäss der geringeren Dicke der ganzen Cuticula, auch weniger stark entwickelt. Nur am Kopfe zeigt die Cuticula ein abweichendes Verhalten: man sieht nämlich bei mikroskopischer Betrachtung an dieser Stelle die Cuticularbedeckungen jederseits halbmondförmig über das Körperparenchym nach Aussen vorspringen. Aussehen und Querstreifung erinnern bei dieser Hervorragung so sehr an die Kopfflügel der *Ascaris mystax*, dass Rudolphi und Andere hier die gleiche Bildung vor sich zu haben glaubten und dem Kopfe Flügel vindicirten.

och diese scheinbaren Flügel sitzen hier dem Rücken und Bauche auf, besitzen eine ansehnliche Dicke und gehen nur ganz allmählig in die benachbarte Cuticula über, was das Unterscheidungsmerkmal von den Kopfflügeln der *scaris mystax*. Die Scheinflügel sind, wie man auf Querschnitten sieht, ein paar blasige Auftreibungen, die durch die Entwicklung eines Hohlraumes in der Substanz der Cuticula entstehen (Leuckart l. c. II., 292 ff.) Die Angabe Küchenmeisters (l. c. I., p. 279), dass sich die Cuticula an den Auftreibungen von der Muskelwand vollständig abgelöst habe, ist irrthümlich; auch nach Innen ist der Hohlraum von einer Chitinlamelle begrenzt. In dem Hohlraum ist eine helle Flüssigkeit enthalten. Seine Grösse und Entwicklung ist nicht durch die ganze Länge der Auftreibung gleich bedeutend; der Mitte umfasst er am Rücken, wie am Bauche, nämlich den vierten Theil des Körperumfangs und zwar so, dass die Höhe ($0,05^{mm}$) von der Medianebene nach den Seiten allmählig abnimmt, während gegen das vordere Ende der Hohlraum allmählig breiter wird und sich über die Seitenflächen verbreitet, so dass der Zusammenhang mit der Muskelwand sich auf einen dünnen Streifen reducirt, der schliesslich, dicht hinter den Lippen aufhört; der Hohlraum greift also an dieser Stelle ringförmig um die ganze Peripherie. Nach hinten wird derselbe allmählig niedriger und schmaler und geht in einer Entfernung von nahezu $0,24^{mm}$ hinter dem Vorderende völlig aus. Die Lippen ragen im Ruhezustande als drei halbkugelförmige Hervorragungen frei aus dem vordern Segmente der Auftreibung hervor, ziehen sich aber bei der

Contraction mehr oder minder tief in die Auftreibung hinein. Ihr Vorstossen wird durch die in den Auftreibungen angesammelte Flüssigkeit vermittelt (Leuckart l. c. II., p. 294). Die Seitenfirsten, welche mit den Scheinflügeln in keinem Zusammenhange stehen, sind Verdickungen der untern Cuticularlage, die in Form einer dreikantigen Prismas von $0,04^{mm}$ Breite und $0,02^{mm}$ Höhe an den Seitentheilen des Körpers vorspringen und die äusseren Hautschichten vor sich herdrängen. Eine besondere Textur ist in denselben nicht nachweisbar. Die Seitenlinien haben genau die Breite der Seitenfirsten, es sind helle Schläuche, die von einer Scheidewand durchsetzt sind, die nach dem Kopfe zu immer deutlicher wird und sich allmählig in einen dreikantigen Körnerstrang verwandelt, dessen Seitenränder die frühere freie Innenfläche des Schlauches überragen. Die Scheidewand schliesst den Seitenkanal in sich, dessen Porus excretorius $0,8^{mm}$ hinter dem Muskelbulbus des Pharynx liegt. Die Medianlinien sind nur schwach entwickelt. Der Nervenring ist deutlich erkennbar und liegt auf der Höhe des hintern Endes der Kopfblase. Seine Structur bietet keine Besonderheiten dar. In Betreff ihrer Muskulatur gehören die Oxyuren zu den Platymyariern, deren Eigenschaften wir schon früher kennen gelernt haben. Die Breite der Zellen ist $0,15^{mm}$, ihre Länge fast 2^{mm} , wovon auf die contractile Substanz nur $0,05^{mm}$ kommt. Nach dem Schwanze zu werden die Zellen kleiner, lassen sich aber bis in seine äusserste Spitze verfolgen, während nach vorn die Muskulatur sich bis in die drei Lippen erstreckt. Die Lippen sind halbkugelförmige Zapfen.

welche beim Weibchen eine Breite von $0,026^{mm}$, eine Höhe von $0,016^{mm}$ besitzen, welche Masse beim Männchen etwas geringer ausfällt. Dicht über der Basis finden wir 6 Papillen, punktförmige Hervorragungen von unbedeutender Höhe darstellend. Der Mund hat, wie bei *Ascaris* eine dreistrahligte Bildung, aber eine unbedeutende Weite, da die Lippen nicht nur kleiner, sondern auch weniger tief gespalten sind. Durch diesen Umstand hat auch die freie Beweglichkeit der Lippen gemindert und das Kopffende wirkt höchstens als eine Pezotte, durch festeres Andrücken an die Unterlage (Leuckart l. c. II., p. 298.) Die Lippenränder sind ohne Furchen und Zähnelung; nur auf der Innenfläche der Lippen erhebt sich eine schwache Längsleiste. Die Mundhöhle ist kurz, dünnhäutig, dreikantig. Ihr hinterer, etwas weiterer Theil umfasst den Anfangstheil des Oesophagus, welcher letztere von ansehnlicher Grösse ist und nach einem Verlauf von 1^{mm} beim Weibchen, $0,5^{mm}$ beim Männchen zu einem kräftigen Muskelmagen, Bulbus führt, dessen Wandungen drei Zahnvorsprünge mit gelblicher Chitinbekleidung besitzen. Zwischen Bulbus und Oesophagus ist eine Einschnürung, welche um so mehr in die Augen fällt, als das untere Ende des letztern sich beträchtlich verdickt, von $0,04$ auf $0,05^{mm}$. Form und Structur des Oesophagus ist dieselbe, wie bei *Ascaris*, nur stehen die Muskelfasern ungewöhnlich dicht und die Körnermasse ist auf die Medianlinie des Rückens beschränkt. Die Nahrung, welche die *Oxyuris* durch die Saugbewegungen des Oesophagus aufnimmt, besteht aus gelblich gefärbter, feinkörniger Substanz, wie sie in dem

menschlichen Kothe massenhaft gefunden wird. Bei der Nahrungsaufnahme weichen die Zahnvorsprünge des Bulbus auseinander, während sie in der Ruhelage mit ihren freien Flächen überall schliessen und nach Art einer Klappe die Nahrungsmittel am Regurgitiren verhindern. Die Zähne können aber nicht nur auseinander weichen und sich wieder nähern, sie können auch nach Abwärts gezogen werden und treiben auf solche Weise, wie ein Stempel, den Inhalt des Bulbus in den folgenden Abschnitt des Verdauungsapparats über (Leuckart l. c. II. p. 301 ff.) Die Gestalt des Bulbus ist fast kugelförmig, doch etwas länger, als breit und sein Innenraum gewährt das Bild zweier dreiseitigen Pyramiden, die mit ihren Basen auf einander liegen, deren eine gewissermassen die Dicke, deren andere den Boden des Hohlraumes darstellt. Von den drei Flächen der Decke hängen drei ansehnliche Zapfen herab, die in der Ruhelage den ganzen Querschnitt ausfüllen, die drei Zähne. Die Muskulatur des Bulbus dient grösstentheils zur Bewegung dieser Zähne und besteht aus einer Anzahl pyramidaler Fibrillen, die sich mit ihrer Basis an die Aussenwand inseriren und durch körnige Zwischenmasse getrennt sind. Die Spitzen der Fibrillen, welche sich zum grössten Theil an den Seitenkanten der Zähne befestigen, verlaufen theils nach Aussen und Oben, theils nach Unten und dienen im ersteren Falle zur Erweiterung, im zweiten zum Herabziehen der Zähne. Der auf den Bulbus folgende Theil des Darmes, der Chylusdarm, ist der ansehnlichste Abschnitt, ein cylindrisches Rohr, das frei durch die Leibeshöhle zieht. Das vordere Ende ist an

weitesten, ohne jedoch einen besonderen Abschnitt zu bilden, wie Küchenmeister (l. c. I., p. 282) annimmt, der es Magen benennt. Das Epithel des Darmes besteht aus grossen, unregelmässigen Sechsecken, deren Höhe nach hinten zunimmt. Der Innenfläche der Epithelwand liegt eine gelblich gefärbte Cuticula auf, welche mit feinen Poren versehen ist. Das Endstück des Chylusdarmes trägt Ringfasern auf der Tunica propria, die an der Uebergangsstelle in den Mastdarm einen förmlichen Sphincter bilden. Das Blut ist auch hier frei in der Leibeshöhle enthalten und enthält Kügelchen von $0,003^{mm}$ in spärlicher Anzahl.

Die Genitalien der Oxyuren sind einfach. Die männliche Genitalröhre ist ein Kanal mit gestrecktem Verlauf, welcher nur $\frac{2}{3}$ der Körperhöhle durchsetzt. Sein letztes Ende ist hakenförmig nach hinten umgebogen ($0,2^{mm}$) und zwar nach der Bauchhöhle zu, während der übrige Theil dem Rücken anliegt. Sie besteht aus vier Abschnitten, von denen der Hoden der ansehnlichste ist und mehr als $\frac{1}{3}$ der Gesamtlänge einnimmt. Sein Durchmesser ist in der untern Hälfte ziemlich beträchtlich, $0,11^{mm}$. Er wird von einer zarten, structurlosen Tunica propria gebildet, der nach hinten eine dünne Epithelschicht aufliegt. Der in der Röhre enthaltene Samen besteht aus kleinen, $0,0058^{mm}$ grossen Ballen von kugelförmiger Form, die einen Kern von $0,0016^{mm}$ einschliessen (Leuckart l. c. II., p. 305). Der Samenleiter ist gleichfalls von ziemlich bedeutender Länge, doch schlanker, $0,08^{mm}$, und mit einem dicken, mehrfach geschichteten Epithel aus runden bläschenartigen Zellen bekleidet,

welches den mit Sperma gefüllten Innenraum auf $\frac{1}{3}$ des Durchmessers verengt. Die Samenblase hat ein starkes Cylinderepithel von $0,09^{mm}$ Höhe, der Ductus ejaculatorius ein Epithel aus runden Zellen. Die Muskulatur des Geschlechtsapparates ist schwach; sie besteht aus Ringfasern, welche auch dem Ductus ejaculatorius nur vereinzelt aufliegen. Der Hinterleib entbehrt des Endpfriems womit das Weibchen versehen ist; er ist stark in die Breite gezogen und nach Hinten fast gerade abgestutzt so dass die Ecken sich deutlich absetzen. Die Spitze des, auch jetzt noch im Ganzen kegelförmigen, Parenchyms ist in zwei divergirende Gabeläste gespalten, die nach den Ecken hinziehen und je hinter einer kleinen warzenartigen Hervorragung daselbst ihr Ende finden. Es sind dies ein paar ansehnliche Schwanzpapillen, die als selbstständige Zapfen nach Aussen hervorragen würden, wenn die Cuticula dem Parenchym dicht aufläge. Zu den Seiten der Kloakenöffnung, sowie rechts und links von derselben, an der Basis der Schwanzkuppe finden sich ähnliche Papillen und zwar sind dieselben an beiden Stellen in zweifacher Anzahl vorhanden. Die auffallende Gestaltung des Hinterleibsendes hat Küchenmeister verleitet es für eine Art Saugnapf zu nehmen (l. c. I., p. 285). Das Spiculum ist einfach, ziemlich dick, $0,07^{mm}$ lang, gerade, bis auf die kurze s-förmig gekrümmte Spitze.

Die weiblichen Geschlechtsorgane sind beträchtlich grösser, als die männlichen; sie bestehen aus zwei Röhren welche von ihrer Spaltungsstelle, etwa $0,5^{mm}$ vor der Körpermitte, divergirend nach vorn und hinten verlaufen.

Die Röhren haben eine ungleiche Länge und zwar misst die hintere bei erwachsenen Weibchen mitunter $10-11^{mm}$, während die vordere nur $6-7^{mm}$ hat. Die Vulva liegt 1^{mm} vor der Körpermitte und führt in einen unpaaren Canal von $1,3-1,5^{mm}$, der auf der Bauchwand nach hinten verläuft, die Vagina. Ihre Weite ist ziemlich gering, um so beträchtlicher aber diejenige der Uteri, 6^{mm} , die von der Spaltungsstelle ihren Ursprung nehmen und gestreckt nach vorn und hinten verlaufen. Der vordere Schlauch lässt sich bis zum Bulbus, der hintere bis über den After hinaus verfolgen. An den betreffenden Stellen angekommen, bilden sie, merklich verengt, eine Schlinge mit dicht anliegenden Schenkeln und durchlaufen dann den zurückgelegten Weg von Neuem. Die letzten Enden beider Röhren bilden in der Nachbarschaft der Vulva einige unregelmässige Schlingen. Dieser hintere Theil enthält die Tuba, von $0,7^{mm}$ Länge und das Ovarium, welches $4-5^{mm}$ misst, Abschnitte, welche beide scharf begrenzt sind, die Tuba durch eine locale Erweiterung von $0,1^{mm}$ Länge, $0,03^{mm}$ Dicke, die Samenblase, das Ovarium durch Beschaffenheit seines Inhaltes und die Unterschiede des Querdurchmessers, der in der untern Hälfte $0,14^{mm}$ misst, während derjenige der Tuba nur $0,02^{mm}$ beträgt. Der obere Abschnitt ($0,6$ bis $0,8^{mm}$) des Ovarium, das Keimfach enthält dicht angeordnete, helle Ballen von $0,004-0,005^{mm}$ mit bläschenartigem Kern; es sind dies die jungen Eier, welche sich nach dem Uebertritt in das Ovarium mit Dotterkörnern, welche nur von geringer Menge, umgeben. Die Eikeime liegen Anfangs in grösserer Menge neben einander, ordnen

sich aber im eigentlichen Ovarium alsbald in eine einzige Längsreihe. Sie haben zuerst ein etwas zusammengedrücktes, keilförmiges Aussehen, nehmen aber in den untern, weitem Theile des Ovarium die gewöhnlich kuglige Gestalt an. Beim Eintritt in die Tuba ist ein Dotterhaut an ihnen noch nicht zu bemerken. Das Epithel des weiblichen Genitaltractus ist im Allgemeinen pflasterförmig und springt an manchen Stellen der Vagina zottenartig in den Innenraum vor. Nur am äussersten Ende der Vagina finden wir statt des gewöhnlichen Epithels vier kolossale Schläuche von $0,16^{mm}$ Länge, die eine eiweissartige Flüssigkeit einschliessen und je einen bläschenförmigen Kern mit Kernkörperchen besitzen. Sie berühren sich mit ihren Innenflächen allseitig und verwandeln das Lumen in einen engen Spaltraum, der mit einer zarten Cuticula bekleidet ist. Diese Zellen wandern während des Lebens bald auseinander, bald nähern sie sich und nehmen unter förmlichen Schluckbewegungen ein Ei nach dem andern aus der Vagina auf, um es nach Aussen zu entleeren (Leuckart l. c. II., p. 314). Die ausgebildeten Eier haben eine ovale Form, eine Länge von $0,05^{mm}$, eine Breite von $0,016^{mm}$. Ihre Menge im Uterus beträgt gegen 10—12000. Die eine Seitenfläche der Eier, diejenige, der später die Bauchfläche des Embryo anliegt, ist merklich platter als die andere; auch die beiden Pole sind verschieden, indem der eine, welcher später das Kopfbende des Embryo enthält, mehr zugespitzt ist. Die Schale ist glatt, von beträchtlicher Festigkeit, lässt eine dreifache Schichtung erkennen und ist mit einer dünnen Eiweisslage umgeben. An

Rückenfläche des Eies, gleich hinter dem Kopfpol ist die Schale beträchtlich verdünnt; lässt man die Eier faulen, so bedarf es nur eines geringen Druckes, um diese Stelle in Form eines Deckelchens von dem übrigen Chorion abzulösen. Meissner und Schneider nehmen diese Stelle als Mikropyle in Anspruch, was jedoch keineswegs zu rechtfertigen ist, da zur Zeit der Befruchtung, in der Samentasche, noch gar kein Chorion besteht.

Die dem Uterus entnommenen Eier zeigen fast alle die gleiche Entwicklungsstufe, sie sind entweder noch unverändert, oder sie sind in der Dotterfurchung begriffen, oder sie enthalten einen Embryo. Die Embryonalentwicklung ist dieselbe, wie wir sie bei *Ascaris* kennen gelernt haben, nur ist die Furchung etwas unregelmässig, indem auf die Zweitheilung immer erst eine Dreitheilung folgt, wie denn auch die späteren Furchungen fast immer an einzelnen Kugeln vor sich gehn. Der ausgebildete Embryo ist ein kaulquappenartiges Wesen mit ovalem Körper und spindeldürrem Schwanze, der nach dem Bauche umgeschlagen ist und bis zur Mitte des Körpers ragt, sehr verschieden von der gewöhnlichen Embryonalbildung. Dieser Embryo ist $0,045^{mm}$ lang, $0,02^{mm}$ breit, wovon der Schwanz fast $0,03^{mm}$ an Länge einnimmt, während seine Breite, selbst an der Basis nur $0,0036^{mm}$ ausmacht. Diese Embryonalform hat Claparède zuerst beschrieben, später auch Vix, welcher letztere jedoch, unrichtiger Weise, die Embryonalentwicklung erst ausserhalb des mütterlichen Leibes vor sich gehen lässt (Leuckart l. c. II., p. 325). Diese Embryonalform geht, wie

Vix zuerst beobachtete, ausserhalb des mütterlichen Körpers eine rasche Veränderung ein. Setzt man die Eier im Sommer in einer feuchten Papierhülle den Sonnenstrahlen aus, so findet man in ihnen schon nach 5 bis 6 Stunden, statt der früheren Embryonen, langgestreckte, schlanke Würmer, welche an Gestalt den geschlechtlich entwickelten Oxyuren nicht unähnlich sind. Die Veränderung, welche der Embryo beim Uebergang in die definitive Form erleidet, beschränkt sich wesentlich auf eine Längsstreckung, vornehmlich des hintern Theiles, des Schwanzes, welcher sich, auf Kosten des Querschnitts des übrigen Körpers, verlängert und verdickt. Dieser Embryo hat eine Länge von $0,14^{mm}$, eine grösste Breite von $0,01^{mm}$. Der Schwanz, welcher $0,021^{mm}$ misst, läuft in eine kugelförmige Spitze aus; der Kopf ist abgerundet und dick; der Darm mit Mund und After ist deutlich markirt; der Oesophagus ist $0,042^{mm}$ lang, am Ende birnförmig verdickt, doch ohne Zähne. Die Umwandlung in diese zweite Embryonalform geht auch im Darm des Trägers vor sich; man findet in den Faeces sowohl, wie im Darmschleim diese langgestreckten Embryonen. Bei niedriger Temperatur und in feuchter Umgebung gehen die Eier schon im Verlaufe weniger Tage zu Grunde, ein langsames Austrocknen schadet ihnen nichts, doch scheint die Lebensdauer der Embryonen überhaupt nur auf den Zeitraum weniger Wochen beschränkt zu sein. Was die weiteren Schicksale dieser Embryonen betrifft, so sollen dieselben nach der Ansicht von Vix und Küchenmeister (l. c. I., p. 229 ff.) zum grossen Theil neben den Mutterthieren im Darme auf-

wachsen. Doch würde das den bis jetzt bekannten That-
sachen durchaus widersprechen, da hiernach die Hel-
minthenbrut allgemein auswandert. Freilich scheint für
die erstere Ansicht zu sprechen, dass die aufgefundenen
Thiere die verschiedensten Altersstufen repräsentiren,
doch besagt dies bei näherer Ueberlegung nur, dass die
Oxyuren ihre ganze Metamorphose im Darne des Trä-
gers durchlaufen. Zudem steht die Zahl der aufgefundenen
freien Embryonen mit der Menge der embryohal-
tigen Eier in gar keinem Verhältniss und die häufige
Einfuhr der Keime erklärt vollständig die verschiedenen
Entwicklungsstufen. Die Uebertragung mit Oxyuren wird
also wohl nur durch Eier geschehen. Auch die von
Leuckart (l. c. II., p. 336) angestellten Experimente
scheinen hierfür zu sprechen. Er verschluckte mit drei
seiner Schüler 1865 eine Portion Eier und schon gegen
Ende der zweiten Woche gingen dreien von ihnen ein-
zelne Oxyuren von 6—7^{mm} Länge ab. Auch später ent-
leerte Leuckart noch einzelne Würmer, im Ganzen bis
in die vierte Woche 18—20. Als derselbe im folgenden
Winter mit Untersuchungen über Oxyuris beschäftigt
war, bemerkte er wiederum den Abgang von diesen Wür-
mern und zwar waren es sämmtlich jüngere Thiere von
2—3^{mm}. Obgleich die geringe Anzahl der angestellten
Experimente noch keinen bestimmten Schluss zulässt,
so kann man doch mit einiger Wahrscheinlichkeit an-
nehmen, dass die Infection mit Oxyuren, direkt durch
embryohaltige Eier, ohne Zwischenwirth vor sich geht.
Die ersten Veränderungen bei der postembryonalen Ent-
wicklung betreffen ausschliesslich das Grössenverhältniss

des Körpers, welcher bis zu $1,5^{mm}$ in Länge, $0,04^{mm}$ in Breite heranwächst, ohne seinen Embryonalcharakter zu verlieren. Hierauf findet eine Häutung statt, womit, wenigstens nach den Beobachtungen Leuckart's (l. c. II., p. 339) bei *Oxyuris ambigua*, die morphologische Entwicklung ihren Abschluss findet. Im Bereiche der Genitalorgane gehen freilich in der Folge noch Veränderungen vor, doch ist die geschlechtliche Differenzirung vorhanden. Die Männchen haben bei 3^{mm} Länge vollständig entwickelte Genitalorgane, die Weibchen erst bei einer Länge von $6-7^{mm}$.

Der *Dochmius duodenalis*, zur Familie der Strongyliden gehörig, ist zuerst von Dubini in Italien entdeckt und später von Bilharz, Pruner und Griesinger häufiger massenhaft in Aegypten bei Sectionen aufgefunden worden. Das Weibchen erreicht eine Grösse bis zu 18^{mm} , eine Dicke von 1^{mm} ; das Männchen ist kleiner, 10^{mm} lang und von etwas geringerer Dicke. Der Wurm besitzt eine derbe und dicke Cuticula von $0,01$ bis $0,017^{mm}$, in der man zwei Lagen unterscheidet, eine dünne äussere, querverringelte und eine darunter liegende dicke, helle, strukturlose. Die Muskulatur besitzt die gewöhnliche Anordnung der Platymyariar. Die fibrilläre Substanz ist dünn und die sie bedeckende Markmasse nur spärlich vorhanden, so dass die Zellen nur wenig in die Leibeshöhle hineinragen. Querstränge, wie wir sie bei den Ascariden kennen gelernt haben, fehlen gänzlich. Die Medianlinien sind, bis auf das Kopfbende schwach entwickelt, desto ansehnlicher aber die Seitenlinien, in welchen man je 3 Kanäle erkennt, von denen die beiden

seitlichen durch ihre ansehnliche Weite ($0,023^{mm}$) auffallen. Der schmale mittlere Kanal liegt in der Scheidewand und bildet das Excretionsgefäss, während die Funktion der beiden andern, welche nach Schneider ebenfalls durch den Porus excretorius ausmünden, noch unbekannt ist. Gleichfalls in den Porus excretorius münden zwei, schon Dubini bekannte, spindelförmige Körper, welche der Bauchfläche aufliegen und $2\text{--}3^{mm}$ weit nach hinten verlaufen. Ihr hinteres Ende ist bauchig erweitert und enthält einen hellen ovalen Kern von $0,1^{mm}$. Es sind dies die bei den Strongylen allgemein angetroffenen Halsdrüsen (Leuckart l. c. II., p. 44, Küchenmeister l. c. I., p. 299). Ausserdem hat Leuckart (l. c. II., p. 415) noch zwei andere Drüsen aufgefunden, welche den Seitenlinien anliegen und bis über die Körpermitte nach Abwärts reichen. Sie werden Kopfdrüsen benannt, haben eine grösste Dicke von $0,15^{mm}$ und bestehen, gleich den Halsdrüsen aus einer strukturlosen Membran, die einen körnigen Inhalt einschliesst. Sie münden in den seitlichen Lippenrändern nach Aussen. Der Schlundring liegt etwa $0,3^{mm}$ hinter dem Vorderende der Mundkapsel, dicht vor dem Porus excretorius, an einer Stelle die auch äusserlich durch zwei konische Hervorragungen ausgezeichnet ist, ein Paar Papillen, die den Seitenlinien aufsitzen und mit einer derben Chitinhülle bezogen sind, welche letztere vermuthen lässt, dass sie als Haftapparate fungiren (Siebold). Der Kopf des Doehmii ist nach dem Rücken umgebogen und zwar oft so stark, dass Kopfachse und Körperachse fast einen rechten Winkel bilden. Der Kopf ist konisch; sein

äusserstes Ende ist nach dem Rücken zu schräg abgestutzt und trägt die Mundöffnung, ein rundliches Loch von $0,068^{mm}$, welches von einem ziemlich scharfen starren Lippenrande umgeben ist. Eine Verengung und Erweiterung der Lippen ist nicht möglich, um so weniger da das Körperparenchym schon in ziemlicher Entfernung von ihnen mit scharfer Grenze aufhört. Dasselbe setzt sich nun freilich an sechs Stellen in Form von Rippen bis zum Mundrande fort, doch dürften die Muskelfibrillen, welche nach der Längsstreifung zu urtheilen in ihnen enthalten sind, auf die Weite der Mundöffnung kaum einen grösseren Einfluss haben. Sie scheinen vielmehr, ähnlich wie die Rippen der männlichen Schwanzkuppe, als Tastwerkzeuge zu dienen, wofür wenigstens der Umstand spricht, dass zwei den Seitenlinien, dem Hauptträger des Nervensystems der Nematoden, entsprechen. Die Füllung zwischen den Rippen besteht aus blosser Cuticularsubstanz. Die Mundkapsel misst bei erwachsenen Thieren $0,1^{mm}$ an Länge, $0,085^{mm}$ an Breite. Dem vorderen Rande der Mundkapsel, und zwar der Bauchwand, sitzen klauenförmige Zähne auf, je zwei zu den Seiten der Mittellinie, dicht neben einander auf einer Strecke von $0,014^{mm}$. Sie erheben sich zu einer Höhe von $0,04^{mm}$, sind hakenförmig gekrümmt und als Haftapparate so wirksam, dass man bei unvorsichtigen Versuchen sie loszulösen nicht selten Gefahr läuft, die Darmwand, in welche sie sich eingebissen, zu zerreißen. Die von Leuckart (l. c. II., p. 420) und Schneider aufgefundenen Rückenzähne, welche den vorigen gegenüber liegen, messen kaum die Hälfte, sind denselben aber

an Form und Lage etwas ähnlich. In der Tiefe der Kapsel, nahe an der Uebergangsstelle in den Pharynx erkennt man an der Bauchwand zwei kräftige Chitinleisten, welche in einer Entfernung von $0,045^{mm}$ von einander neben der Mittellinie stehen und mit ihren aufwärts gekehrten Spitzen $0,05^{mm}$ in den Innenraum hineinragen. Sie sind durch Grösse, Festigkeit und Zuspitzung ein Paar dolchartige Instrumente, sehr geeignet, die andrängenden Weichtheile zu durchschneiden. Ihnen gegenüber an der Rückenwand liegt eine dritte, mehr konische Erhebung, welche nicht die Festigkeit der vorigen Erhebungen hat, da sie unter einem dünnen Chitinüberzuge eine weiche Pulpa enthält. Das hintere Ende der Mundhöhle ist trichterartig verjüngt und setzt sich direkt in den Pharynx fort, welcher, zuerst ein ziemlich weiter dreieckiger Kanal, sich bald verengert und dreistrahlig wird. Der Pharynx beträgt ungefähr den zehnten Theil der Körperlänge, ist anfangs schlank ($0,05^{mm}$), nimmt aber nach hinten so beträchtlich an Dicke zu, dass man ihn füglich mit einer Flasche vergleichen kann. Seine Structur bietet weiter keine Eigenthümlichkeiten dar. Die Cardia springt mit einem dreilappigen Zapfen muttermundartig in den Chylusdarm vor. Der Darm ist ansehnlich weit und nimmt mehr, als den halben Durchmesser der Leibeshöhle ein. Er ist im Leben strotzend mit Blut, der Nahrung des Wurmes, gefüllt. Seine Wand ist eine feinkörnige, gelbliche Masse, der eine strukturlose Tunica propria aufliegt und welche auf der Innenfläche eine dicke Cuticula trägt, welche in einen dichten Borstenbesatz verklüftet

ist. Die Körnermasse gehört einem Pflasterepithel von ausserordentlicher Grösse an; jede Zelle umfasst die halbe Peripherie des Darmes. Der Mastdarm ist nur von unbedeutender Länge.

Die Genitalröhren sind von beträchtlicher Länge, durchziehen bei beiden Geschlechtern den ganzen Körper von der Cardia bis zum After und bilden im Umkreis des Darmkanals eine beträchtliche Menge von Schlingen. Die Gesamtlänge der männlichen Röhre beträgt das Doppelte der Körperlänge, die der beiden weiblichen Eiröhren mindestens das 4—5fache. Der männliche Apparat lässt drei Theile unterscheiden: den Hoden mit dem Samenleiter, die Samenblase und den Ductus ejaculatorius. Letztere beiden haben einen gestreckten Verlauf und eine beträchtliche Weite, während die beiden andern einen fadenförmig dünnen, stark gewundenen Kanal darstellen mit auf- und absteigendem Schenkel. Das untere Ende des absteigenden Schenkels erweitert sich zu der Samenblase, welche stabförmige Spermatozoen ($0,01^{mm}$) enthält und einen, nach beiden Seiten scharf abgegrenzten, ovalen Schlauch von $0,2^{mm}$ Dicke, $0,5^{mm}$ Länge darstellt, der dicht vor der Körpermitte gelegen ist und durch einen s-förmig gekrümmten dünnen Kanal mit dem Ductus ejaculatorius verbunden ist. Letzterer hat die halbe Körperlänge, eine keulenförmige Gestalt und ist so dick, dass sein oberer Theil fast die ganze Leibeshöhle einnimmt und zur Aufnahme des Darmes mit einer Rinne versehen ist. Nur in seiner Mitte hat er einen engen Kanal, während die Seitenflügel solide sind. Der Hoden enthält eine Rhachis wie wir sie schon

ennen gelernt haben; die Structur der einzelnen Ab-
 schnitte ist unbekannt. Die beiden Spicula sind dünne
 Stäben von höchstens 1^{mm} Länge, besitzen eine braune
 Farbe und sind am untern Ende in ein hohlsondenartiges
 Stütztstück eingelassen, welches in kurzer Entfernung
 hinter der Geschlechtsöffnung liegt. Im zurückgezogenen
 Zustande weichen sie v-förmig auseinander, bei der Be-
 fruchtung treten sie parallel aus der Hohlsonde hervor
 (Leuckart l. c. II., p. 426). Das Hinterleibsende des
 Männchens ist ein schirmförmiger Copulationsapparat.
 Die Geschlechtsöffnung liegt auf einem konischen Zapfen
 von beträchtlicher Grösse, welcher sich zwischen den
 vorderen Rändern der Bursa erhebt und von einer dicken
 Cuticula bekleidet ist. Es ist eine Längsspalte und liegt
 in einiger Entfernung von der Spitze des Zapfens an der
 Bauchseite. Die Bursa ist dreilappig, breiter, als lang;
 die Schwanzrippe ist am äussersten Ende gespalten und
 hat drei kurze zapfenförmige Ausläufer, deren innerer
 nur halb so lang ist, als die beiden äusseren. Die Seiten-
 der Bursa werden von je fünf Seitenrippen gebildet, von
 denen die drei mittleren einem gemeinschaftlichen Stamme
 entspringen, während die hintern je aus der Wurzel der
 Rücken- oder Schwanzrippe hervorkommen. Die vorderen
 Seitenrippen sind der Länge nach gespalten. Die Enden
 der Rippen tragen je eine kleine Cuticularpapille. Die
 Rippen sind sehr beweglich, wodurch die Bursa zu einem
 Greifapparate wird, welcher den Leib des Weibchens
 umfasst und festhält und zwar mit solcher Kraft, dass
 man förmlich Gewalt anwenden muss, um das sich be-
 findende Pärchen zu lösen. Die Männchen sind seltener,
 als die Weibchen und zwar ist das Verhältniss wie 1:3.

Die Vulva liegt ungefähr 1^{mm} hinter der Körpermitte und stellt eine Querspalte dar mit aufgeworfenen Lippen, welche zunächst in einen Kanal führt, der sich rechtwinklig von der äusseren Körperwand erhebt, dann aber nach kurzem Verlauf in zwei diametral nach vorn und hinten aus einander laufende Genitalröhren übergeht, welche, von ziemlicher Weite, bis in die Nähe des Anus und der Cardia sich unter Schlängelungen hinziehen und sich hier zu fadenförmigen Kanälen verdünnen und mit zahlreichen Windungen um den Darm die ganze Leibeshöhle erfüllen. Die Endigungen beider Röhren liegen getrennt oberhalb der Vagina. Die Eier gruppieren sich im Ovarium um Rhachiden, welche, allmählig dünner werdend, beim Uebergange des Ovarium in den Eileiter gänzlich geschwunden sind, sodass letzterer isolirte dicht gedrängte Dotterhaufen einschliesst, welche in seinem unteren Theile bereits ihre volle Grösse erreicht haben. Die Tunica propria dieser beiden Abschnitte trägt auf ihrer Innenfläche einen ziemlich hellen Beleg mit Zellkernen. Der Uterus ist scharf gegen den Eileiter abgesetzt und hat eine Länge von mindestens 4^{mm} . Er enthält Eier und Samen, besitzt keine Muskulatur und hat ein Epithel von grossen hellen Zellen, welche von geringer Höhe sind. Der Uterus führt in eine Vagina, die paarig ist, wie er selbst und eine kräftige Muskulatur aus rechten und linksgewundenen Diagonalfasern besitzt. Der kurze Quergang, in den die beiden Vaginae münden, hat nur eine einfache Längsfaserschicht. Das Epithel der Vagina besteht aus hellen Zellen von ansehnlicher Grösse, buckelförmig nach Innen vorspringen. Die reifen Eier

sind ovale Körperchen von $0,05^{mm}$ Länge, $0,027^{mm}$ Breite, mit einer einzigen glashellen, dünnen und festen Schale und wenig durchsichtigem grobkörnigen Dotter. Während sie die Scheide passiren, tritt nicht selten in ihnen die erste Klüftung ein, welche im Darmkanal der Träger fortgesetzt wird, sodass man im Kothe die Eier mit sechs- oder achtgetheiltem Dotter antrifft. Ueber die weiteren Schicksale der Eier ist nichts bekannt, doch lässt sich vermuthen, dass dieselben gleiche Veränderung erfahren, wie diejenigen des nahe verwandten *Dochmius rigonocephalus*. Bei der letzteren Art verwandelt sich der Dotter nach der Entleerung der Eier innerhalb weniger Tage in einen rhabditisartigen Embryo, der die umhüllende Schale durchbricht und, durch seine Organisation zu einem freien Leben befähigt, sich in Schlamm und schlammigem Wasser einige Zeit umhertreibt (Leuckart, l. c. II., p. 454 ff.) Die Embryonalentwicklung zeigt keinerlei Besonderheiten dar. Die ausgewachsenen Embryonen liegen zickzackförmig gewunden im Innern des Eies; es sind gedrungene Würmer von $0,3$ — $0,4^{mm}$ Länge und $0,095^{mm}$ Dicke, deren Körper, nach vorn etwas verjüngt, nach hinten in eine dünne Spitze ausläuft mit pfriemenförmigem Ende. Die Embryonen enthalten die charakteristische Mundkapsel; ihr Pharynxrohr ist ein dickwandiger Kanal, der $\frac{2}{3}$ der Körperlänge einnimmt und in eine kuglige Anschwellung ausläuft, die in ihrem Innern drei konische Chitinzapfen trägt. Uebersichtlich sind unsere Embryonen den jungen Würmern des Genus *Rhabditis*, einer frei lebenden kleinen Nematodenart, so ähnlich, dass sie nicht von ihnen zu unterscheiden

sind. Sie geniessen auch nach Rhabditidenart eine feinertheilte organische Nahrung und beginnen bald nach ihrem Ausschlüpfen zu wachsen. Bei einer am 3. Tag stattfindenden Häutung legen sie die pfriemenförmige Schwanzspitze ab und wachsen dann bis zum Ende der 3. Woche bis zu $0,56^{mm}$ Länge, welches Grössenwachsthum besonders den mittleren Leibesabschnitt betrifft und $0,028^{mm}$ Dicke. Jetzt folgt eine zweite Häutung wobei der Pharynx seine Bewaffnung, der Wurm seine Fähigkeit Nahrung aufzunehmen und zu wachsen verliert, im Uebrigen aber der Bau im Wesentlichen derselbe bleibt. Im schlammigen Wasser bleiben die Würmer trotzdem noch Monate lang am Leben; sie zehren von den gesammelten Vorräthen, wodurch Darm und Leibeswände ihre frühere körnige Beschaffenheit verlieren und der Wurm hell und durchsichtig wird, wie ein Glasstab. Der Doehmies entwickelt sich ohne Zwischenwirth; er wandert direkt aus dem schlammigen Wasser in den Darm des Hundes, wächst hier binnen 8 Tagen bis auf 1^{mm} im Magen, wo er vorläufig seinen Wohnsitz aufgeschlagen und geht am 9. oder 10. Tage eine Häutung ein, wobei der Mund eine mehr bauchige Gestalt erhält. Binnen 3 Tagen wachsen die Würmer jetzt auf 2^{mm} , häuten sich dann abermals und erlangen dadurch ihre geschlechtliche Differenzirung. Bald nach der Anlage des bauchigen Mundbechers wandern die Würmer in das Duodenum über und erhalten nach zweimaliger Häutung jetzt ihre definitive Gestaltung. (Vgl. Leuckart l. c. II., p. 436 ff.)

Der *Trichocephalus dispar*, zu dem Genus der Trich

tracheliden gehörig, hat einen fadendünnen Vorderleib, während der Hinterleib, welcher $\frac{2}{5}$ der Körperlänge einnimmt, walzenförmig aufgetrieben ist und eine Dicke von 1^{mm} erlangt. Letzterer ist beim Männchen in eine flache Spirale von $1\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$ Umläufen eingerollt, beim Weibchen ist er mehr gestreckt. Das Männchen erreicht eine Grösse von $40 - 45^{mm}$, das Weibchen misst bis 50^{mm} . Die Cuticula des menschlichen Peitschenwurms ist farblos und hat eine grösste Dicke von $0,02^{mm}$. Die Aussenfläche zeigt Querringel, welche von der festen, aber unbedeutend dicken Epidermis gebildet werden. Das Corium besteht aus zwei gleich dicken, scharf gegen einander abgesetzten Schichten, deren äussere glänzend und gelblich schimmernd, deren untere von mehr mattem Aussehn ist. Beide Schichten sind, nach Eberth, gefasert und zwar umziehen die Fasern der innern Schicht den Leib in diagonalen Richtung nach rechts und links, während die weit zarteren und leicht gekräuselten Fasern der äussern Schicht parallel von einer Seite zur andern verlaufen. Die Bauchfläche des Vorderkörpers trägt eine Menge bandartig zusammengruppirter, punktförmiger Hervorragungen, die je von einem senkrecht in die äusseren Bedeckungen eingelagerten Chitinstäbchen herühren und das sogenannte granulirte Längsband bilden. Die Stäbchen sind schlanke Cylinder von $0,0017^{mm}$ Durchmesser und glänzendem Aussehn. Die über ihnen hinziehende Epidermis wird durch die abgerundeten Aussenenden höckerartig aufgetrieben, wodurch das Band die Fähigkeit erhält, als Haftorgan zu dienen. Das vordere Ende des Bandes beginnt $0,1^{mm}$ hinter der Mundöffnung, ist Anfangs nur von geringer Breite, nimmt aber bald

den grössern Theil der Bauchfläche ein und verschwindet allmählich in der Nähe des dickeren Hinterleibes, indem es sich nach und nach verschmälert und die dünner und blasser werdenden Stäbchen immer weiter auseinander rücken. Die subcuticulare Körnerlage besitzt eine feine Radiärzeichnung; sie ist nur dünn, wächst aber unter den Stäbchen bis zur Dicke der Cuticula. Die Muskulatur des Trichocephalus zeigt mancherlei Abweichungen, von dem Verhalten der Coelomyarier so gut, wie von dem der Platymyrier. Sie besteht, wie man auf dünnen Querschnitten erkennt, aus einer grossen Anzahl bandförmiger, dünner Erhebungen, die sich wie die Blätter eines Buches mit ihren Seitenflächen berühren und ihre äusseren Kanten der Subcuticula zuwenden. Sie sind von unbedeutender Dicke und geringer Höhe ($0,015^{mm}$) und gleichen mehr den ebenfalls blattförmig neben einander stehenden Muskelfibrillen der Platymyrier, als denen der Coelomyarier; doch während die Muskelblätter der ersteren sich an der Grenze der einzelnen Zellen scharf gegen einander absetzen, sind die der Trichocephalen zu einer zusammenhängenden Schicht an einander gereiht, die nur hie und da an den Verbindungsstellen mit der Subcuticula der Länge nach etwas eingekerbt ist. Die Abstände der Kerben zeigen eine wechselnde Grösse, so dass durch sie bald 8—10, bald auch die doppelte Menge von Muskelblättern abgesetzt sind. Den einzelnen Fibrillengruppen liegt je ein heller Vorsprung auf, der genau die Verhältnisse der Muskelblasen wiederholt und an manchen Stellen auch einen bläschenförmigen Kern mit Kernkörperchen enthält. Die Dicke de

Muskelwand mit Auflagerungen beträgt nur wenig mehr, als die der Cuticula; die Peitschenwürmer sind also Muskelschwach und demgemäss ist ihre Beweglichkeit auch sehr gering (Leuckart l. c. II., p. 470 ff.) Das Muskelgewebe wird durch die Längslinie nicht unterbrochen. Die Seitenlinien sind nur schwach entwickelt, von einer dünnen Chitinleiste durchzogen und trennen nur die Schichtenlage der Muskeln. Ueberhaupt erkennt man sie nur am Vorderleibe und bemerkt in einzelnen Querschnitten in ihnen ein kleines Löchelchen, welches jedenfalls dem Längskanale angehört, obwohl ein Porus excretorius bis jetzt noch nicht aufgefunden ist. Medianlinien sind noch nicht mit Sicherheit aufgefunden, doch glaubt Leuckart (l. c. II., p. 473) zwischen den Muskeln des Rückens eine solche aufgefunden zu haben. Ein Nervencentrum ist nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Leuckart und Eberth haben zwar in einzelnen Fällen in kurzer Entfernung hinter der Kopfspitze ($0,1^{mm}$) ein scheinend körniges Band aufgefunden, das um den Oesophagus herumliief, allein Nervelemente fanden sich nicht in demselben. Bei anderen Thieren liess sich das Band überhaupt nicht auffinden, so dass die Deutung desselben als Schlundring mindestens zweifelhaft ist. Das vordere Körperende, welches die Mundöffnung trägt, ist ein langgestreckter, schlanker Cylinder, der an der Übergangsstelle in die schlanke Spitze etwa $0,017^{mm}$ im Durchmesser hat und ziemlich rigide ist. Papillen fehlen am Kopfende. Die Mundöffnung ist klein und rund; sie führt in eine kurze und trichterförmige Mundhöhle. In vielen Fällen findet man statt dieser letztern eine buckel-

förmige leichte Auftreibung, woraus man schliessen muss, dass die Wände umgestülpt werden können. Leuckart (l. c. II., p. 475) ist der Ansicht, dass diese Fähigkeit mit dem Bohrvermögen zusammenhängt, was an Wahrscheinlichkeit gewinnt durch den Umstand, dass die bohrenden Embryonen der Trichinen, Spiropteren und anderer Nematoden eine retractile Beschaffenheit des Kopfendes besitzen. Der Oesophagus ist unverhältnissmässig lang; er durchsetzt den ganzen Vorderleib, $\frac{2}{3}$ der Körperlänge, und besitzt eine schwache Muskulatur. Sein Lumen ist sehr gering und beträgt selbst am hinteren Ende, wo es am beträchtlichsten ist, kaum $0,006^{mm}$. Man muss an dem Oesophagealrohr zwei Abschnitte unterscheiden, einen vorderen, den sogenannten Munddarm, welcher nur $0,4^{mm}$ misst und nach Schneider die gewöhnliche Oesophagusstructur besitzt, und einen hinteren von ganz anderer Structur. Die Dicke dieses letzteren Abschnitts steigt allmählig von $0,02^{mm}$, welche das letzte Ende des erstern Abschnitts hat, auf $0,1^{mm}$ und statt des Muskelgewebes finden wir hier eine Längsreihe grosser Zellen. Das Innenrohr mit der jetzt cylindrischen Chitinwand liegt an der Bauchfläche, gleichsam in einer Rinne des Zellenkörpers. Die Zellen sind langgezogen, $0,2^{mm}$ lang mit Kern und Kernkörperchen und von einer Anzahl ringförmiger Abschnürungen umgürtet (je 5—8). Das hintere Ende des Zellenkörpers zieht sich gewöhnlich in zwei zipfelförmige Anhänge aus, die rechts und links von dem Anfangstheil des Chylusdarmes in die Leibeshöhle ragen und je einen grossen bläschenförmigen Kern besitzen. Der Chylusmagen ist von dem Oesophagus

durch eine tiefe Einschnürung abgegrenzt und zieht als ein schlanker Cylinder an der Rückenfläche des Körpers hin. Das Rectum ist eng, deutlich abgesetzt, beim Weibchen $0,3^{mm}$ lang, $0,04^{mm}$ dick und beim Männchen bis zur Insertion in die Kloake fast von gleicher Länge und Dicke. Die Aussenwand ist von einer dicken Ringmuskellage umfasst. Der After des Weibchens ist ventral, der des Männchens mehr terminal (Leuckart l. c. II., p. 475). Die Geschlechtsorgane sind ausschliesslich auf den verdickten Hinterleib beschränkt, woher auch die Walzenform desselben rührt. Die Genitalröhre ist nicht sehr lang, übersteigt selbst beim Weibchen nur wenig die Körperlänge, hat aber eine beträchtliche Dicke. In beiden Geschlechtern finden wir eine ziemlich weite Keimröhre ($0,15^{mm}$), die in dicht gedrängten Schlangengewindungen vom hinteren Körperende emporsteigt, bis sie in der Nähe der Cardia sich verengernd in den Keimleiter übergeht, der nach hinten umbiegend neben der Keimdrüse zurückläuft, um am Hinterende des Männchens sich in die Kloake zu inseriren, beim Weibchen aber den ursprünglichen Verlauf wieder aufzunehmen und dann auf der Höhe der Cardia auszumünden. Die von der Keimdrüse gelieferten Zeugungsstoffe sind nicht um eine Rhachis gruppiert, sondern liegen bei ihrer Entstehung in mehrfacher Lage der Drüsenwand auf und zwar beim Männchen der ganzen Innenfläche, beim Weibchen, nach Leuckart (l. c. II., p. 480), nur der der Bauchfläche zugekehrten Wand. Eberth und Schneider lassen auch die Samenzellen einen einseitigen Ursprung nehmen. Die Stoffe lösen sich früh ab und nehmen im

Innenraum der Röhre ihre definitive Gestalt an, doch sind die im Hoden sich ablösenden Zellen nicht die definitiven Spermatozoen (Eberth), sondern die Mutterzellen (Leuckart l. c. II., p. 481). Die Wand des Hodens ist eine structurlose Membran. Der Samenleiter hat an seinem Ursprung eine nur geringe Weite, doch wächst der Durchmesser alsbald, anfangs zwar nur wenig, dann aber plötzlich sehr bedeutend: der Samenleiter erweitert sich zur Samenblase, welche eine Dicke von $0,32^{mm}$, eine Länge von 5^{mm} hat und deren unteres Ende durch einen s-förmig gekrümmten engen Kanal in den Ductus ejaculatorius führt. Letzterer hat eine Länge von $3,6^{mm}$ und einen gleichen Durchmesser, wie der vorige Abschnitt, der sich jedoch nach hinten etwas verjüngt. Der Samenleiter hat eine dünne Ringmuskellage auf seiner Tunica propria, der Ductus ejaculatorius eine dicke Ring- und Längsmuskelschicht. Der Samenleiter hat ein Pflasterepithel, welches am hinteren Ende der Samenblase zottig wird; das Epithel des Ductus ejaculatorius besteht aus Cylindern von $0,07$ — $0,09^{mm}$ Länge, welche sein Lumen bis auf $\frac{2}{3}$ des Durchmessers verringern. Das Kloakrohr misst $0,25^{mm}$ an Durchmesser, 4^{mm} an Länge und hat eine $0,1^{mm}$ dicke Muskellage, welche sich aber nach hinten mit dem Kloakrohr zugleich verdünnt. In einiger Entfernung unterhalb der Mitte findet sich an der Rückenfläche eine 1^{mm} lange schlanke Ausstülpung, die Penisscheide, welche durch zwei lange Muskelfasern an der Rückenwand des Körpers befestigt ist und das Wurzelende des hornartigen Spiculum umfasst. Die obere Hälfte des Rohres trägt

auf der Innenfläche der Ringmuskellage eine Schicht glänzender Zapfen, von $0,01^{mm}$ Höhe, $0,0034^{mm}$ Breite, über welche eine Chitinlage hinzieht; es sind Cylinder-epithelzellen, die einzeln mit einem Chitinüberzuge versehen sind (Leuckart l. c. II., p. 484). Im untern Theile der Kloake trifft man auf ein gefaltetes Chitinband, welches ohne Zusammenhang mit den Wänden ist und sich von der Einmündungsstelle der Penisscheide an als ein gefaltetes Rohr zu erkennen giebt; es läuft eine Strecke lang neben dem Spiculum, wird dann von ihm durchbohrt und bildet um dasselbe ein Präputium, welches, ohne Zusammenhang mit Kloake und Spiculum an der Oeffnung der ersteren continuirlich in die äusseren Bedeckungen übergeht (Küchenmeister l. c. I., p. 246, Leuckart l. c. II., p. 485). Wahrscheinlich entsteht diese Bildung als eine Cuticularbekleidung des Kloakrohres, welche später abgestossen wird und einer neuen Chitinhülle Platz macht. Auf der Innenfläche des Praeputium findet man aufsitzende Zähnchen, deren Spitzen in der Ruhelage nach hinten gerichtet sind, während der Umstülpung aber, welche wahrscheinlich von einer geringen Menge Flüssigkeit herrührt, die zwischen Praeputium und Kloakrohr sich vorfindet, die entgegengesetzte Richtung haben (Leuckart l. c. II., p. 486). Das Spiculum ist $2,5^{mm}$ lang und, bis auf den konisch verdickten Anfangstheil, $0,034$ — $0,04^{mm}$ dick. An den weiblichen Organen unterscheidet man: Ovarium, Eileiter, Uterus und Vagina. Die spaltartige Vulva liegt auf der Höhe der Cardia. Die locker aufliegende Scheidenhaut ragt nicht selten zapfenförmig aus ihr hervor, so dass

die mit Zähnchen besetzte Innenfläche nach Aussen gekehrt ist. Diese umgestülpte Scheidenhaut wird wahrscheinlich bei der Begattung von dem Praeputium umfasst, so dass die Zähnchen beider Theile in einander greifen (Leuckart l. c. II., p. 488). Das mit Chitinstacheln besetzte äussere Scheidenende ist gegen den übrigen Theil scharf abgesetzt, hat eine Länge von $0,7^{mm}$, eine Dicke von $0,15^{mm}$ und ist mit einer starken Ringmuskellage umgeben.

Der folgende Abschnitt der Vagina ist von geringerer Dicke, ($0,1^{mm}$) aber länger ($2,5^{mm}$) und mehrfach geschlängelt. Die Muskulatur hat bedeutend an Dicke abgenommen; Chitinstäbchen fehlen, aber unter der Cuticularbekleidung erheben sich ansehnliche Zotten ($0,014^{mm}$), welche zapfenförmig in den Innenraum vorragen. Beim Uebergange in den Uterus erweitert sich das Lumen bedeutend, während die Muskulatur zu einer dünnen Lamelle wird, welche auf ihrer Innenfläche ein körniges Cylinderepithel trägt. Der Uterus ist bei älteren Weibchen ein Kanal von $0,6^{mm}$ Durchmesser, $9-10^{mm}$ Länge. Die Tuba hat nur $0,08^{mm}$ Durchmesser, stimmt aber sonst in ihrem histologischen Bau mit dem Uterus überein. Das Ovarium ist dem Hoden an Grösse und Form so ähnlich, dass man beide nur durch den Inhalt unterscheiden kann. Die Eier sind kernartige Bläschen von $0,02^{mm}$, welche auf $0,04^{mm}$ heranwachsen und nur einen geringen Reichthum an Dotterkörnern besitzen. Beim Uebertritt in den Eileiter haben dieselben eine runde Form, werden jedoch oval, wobei die anfangs abgerundeten Pole eine zapfenförmige Gestalt annehmen und,

nach Verlust der darin enthaltenen Dotterkörner, schliesslich als ein paar helle kappenartige Aufsätze erscheinen, unter denen der körnige Dotter mit scharfer Grenze hinwegzieht. Die Grenzschrift des Eies hat sich zugleich zu einer Dotterhaut entwickelt und im Uterus mit einer dicken braunen Schale bekleidet, aus der die beiden Zapfen stöpselartig hervorragen. Die ausgebildeten Eier haben eine Breite von $0,023^{mm}$, eine Länge von $0,051^{mm}$, ohne die Zapfen. Die Befruchtung geschieht im letzten Abschnitt des Eileiters, stets vor Ablagerung der Schale. Die Samenkörperchen sind birnförmig und messen $0,025$ bis $0,035^{mm}$.

Die Angabe Küchenmeisters (l. c. I., p. 249), dass die Eier bald noch unverändert sind, bald einen Embryo enthalten ist durchaus unrichtig. Die frisch entleerten Eier sind stets noch ohne irgend ein Zeichen der Entwicklung (Leuckart l. c. II., p. 492, Schneider, Davaine u. A.) Erst nach längerem Aufenthalte in Wasser oder feuchter Erde zeigt der Dotter die ersten Spuren der Klüftung und erst nach 4—5 Monaten im günstigsten Falle, sonst auch wohl erst nach $1\frac{1}{2}$ Jahren ist die Embryonalentwicklung vollendet. Letztere ist zuerst von Davaine beobachtet worden 1857 und bietet keinerlei Besonderheiten. Die reifen Embryonen haben ungefähr dreimal die Länge des Eiraumes, besitzen einen Schwanz, welcher der Dicke des Kopfes beträchtlich nachsteht, sind aber sonst nur von geringer Entwicklung, so dass man weder einen ausgebildeten Darm, noch eine Geschlechtsanlage bei ihnen findet. Der grösste Theil des Leibes ist von einem cylindrischen grobkörnigen Körper

eingegenommen, ohne Hohlraum, die erste Anlage des Zellenkörpers. Der Darm erscheint als ein dünner Körnerstrang zwischen dem verjüngten Hinterleib und dem Zellenkörper und misst nur den vierten Theil des letztern. Bei der Kleinheit der Eier des Peitschenwurmes und der Häufigkeit seines Vorkommens, müssen dieselben weit verbreitet sein und kann es ihnen an Gelegenheit zum Uebersiedeln in den Menschen nicht fehlen. Die Hypothese Küchenmeister's (l. c. I., p. 236 u. 250), dass die Trichinen junge Trichocephalenbrut seien, hat sich nicht bestätigt, beide Thiere sind vielmehr von einander verschieden. Ob zum Uebergang des Embryo in den definitiven Zustand ein Zwischenwirth nöthig sei oder nicht, wird von Leuckart (l. c. II., p. 497 ff.) zu Gunsten der letztern Uebertragungsweise entschieden. Derselbe wählte zu seinen Versuchen den Trichocephalus affinis, welcher mit dem Trichocephalus dispar nahe verwandt ist und verfütterte die reifen Eier eines solchen an ein Schaf (1865). Sechszehn Tage nach der Verfütterung fanden sich im Darne eine Anzahl Würmchen von $0,8-1^{mm}$, den Darmtrichinen ähnlich. Zwar liessen dieselben nach Form und Bildung keine entscheidende Anhaltspunkte ihrer Abstammung erkennen, da aber bei einem zweiten Versuchsthier sich ein gleiches Resultat ergab, so unterliegt es keinem Zweifel, dass die Trichocephalen sich ohne Zwischenwirth entwickeln. Die Länge der Thiere war in den 16 Tagen von $0,27^{mm}$ bis auf $0,8-1^{mm}$ gestiegen, die Dicke von $0,014^{mm}$ auf $0,03^{mm}$. Bei dem zweiten Versuchsthier fanden sich 4 Wochen nach der Fütterung 60—80 junge Trichocephalen, deren

grösste 26—30^{mm} massen. Schon die kleinsten Exemplare zeigten die charakteristischen Merkmale der Trichocephalen und von 2^{mm} an fand man auch schon schlauchförmige Genitalien. Vier bis fünf Wochen schienen zur völligen Ausbildung zu genügen.

Aetiologie.

Die *Taenia Solium* schmarotzt ausschliesslich beim Menschen und scheint mit dem Schweine einen gleichen Verbreitungsbezirk zu haben. Abgesehen von Indien ist dieselbe bis jetzt gefunden worden in ganz Europa, in Algier und Nordamerika. Sie bewohnt den Dünndarm des Menschen und kommt meist in der Einzahl vor, doch nicht so ausschliesslich, wie von älteren Autoren angenommen wurde. Zwei bis drei Würmer bei einem Individuum sind gar nicht so selten; 6—10 sind mehrfach beobachtet (Pfaff); Kybuss trieb binnen 8 Stunden 25 ab; Frau Heller beobachtete 30, Küchenmeister 33, Kleefeld sogar 41 bei demselben Individuum. So lange der Wurm seine volle Lebenskraft hat, hängt er den Kerkringschen Falten, und zwar theils der Fläche und Kante der Zotten, theils dem Raume zwischen den Falten (Küchenmeister), so fest an, dass man ihn weithin ziehen und dehnen kann, ehe er loslässt. Von der Anheftungsstelle hängt der Wurm frei in der Richtung des Chymusstromes in den Darmkanal hinein, bald gestreckt, bald schlingenförmig zusammengelegt und selbst geknäuel; doch mag er bei heftigem Erbrechen auch die entgegengesetzte Lage annehmen, wie man denn

Beispiele hat, wo er ganz oder theilweise durch den Mund entleert wurde (Davaine, van Doeveren, Lavalette). Der gewöhnliche Weg auf welchem der Wurm abgeht ist der After, doch kann er gelegentlich auch durch abnorme Oeffnungen, wie Fisteln, sich entfernen (Richter, Spoering, Herz). Der Abgang der Bandwurmglieder ist an keine bestimmte Zeit gebunden; und wenn zu gewissen Zeiten derselbe häufiger ist, so haben sicherlich nicht der Mond und seine Phasen, nicht andere periodische Zeiten darauf Einfluss, sondern die Sache liegt jedenfalls in periodischen äusseren und inneren Ursachen, welche theils den Zustand des bewohnten Darmstücks, theils die Vegetationsverhältnisse des Wurmes selbst betreffen.

Die *Taenia mediocanellata* stimmt in ihrem Verhalten ziemlich mit der vorigen überein, nur scheint sie weiter verbreitet zu sein, als jene. In Wien wurde sie schon von Bremser beobachtet; im südöstlichen Württemberg und den angrenzenden Theilen Baierns findet sich fasst ausschliesslich diese unbewaffnete Taenie (Weishaar); Schmidtmüller fand auf Java unter 148 meisst von Guinea importirten Taenien keine einzige bewaffnete und nach Bilharz ist die Taenie der Neger und Abyssinier stets ohne Haken und der *Taenia mediocanellata* zuzurechnen. Nach Kaschin sind die am Baikal lebenden Buräten eben so constante Bandwurmträger, als Neger und Abyssinier. Im Allgemeinen findet sich unsere Taenie besonders häufig in den wärmeren Gegenden der alten Welt und wird wohl der Bandwurm der Alten sein.

Der *Bothriocephalus latus* hat einen engeren Verbreitungsbezirk, als die Taenien, ist ausserhalb Europa noch nicht mit Sicherheit beobachtet worden und kommt auch in Europa nur in gewissen Ländern und Gegenden vor, welche sich alle durch ihren Wasserreichthum auszeichnen. Ziemlich häufig trifft man ihn in den Kantonen der westlichen Schweiz und den angrenzenden französischen Districten, in den nordwestlichen und nördlichen Provinzen Russlands, in Schweden und Polen. In Holland und Belgien ist er seltener. In Deutschland kommt er namentlich vor in Ostpreussen und eingeschleppt, aber auch selten in Pommern, es sind auch in Rheinhessen, Hamburg, selbst Berlin einzelne Fälle vorgekommen. Auch dieses weiss man von London, St. Malo, Montpellier, Genf, Zürich. Der Wurm, welcher meist in mehreren Exemplaren bei demselben Individuum vorkommt, findet sich in einzelnen Gegenden in ausserordentlicher Häufigkeit; so leidet in Genf fast $\frac{1}{3}$ der Einwohner an *Bothriocephalus* (Odier) und in der schwedischen Provinz Nordlappland soll, nach Huss, Niemand, weder Reich noch Arm, Jung noch Alt von ihm verschont bleiben und selbst Säuglinge sind nicht ganz frei von ihm.

Die *Ascaris lumbricoides* gehört zu den häufigsten Parasiten des Menschen, ist über die ganze bewohnte Erde verbreitet und war schon Hippocrates bekannt. Die Häufigkeit wechselt auf das Mannigfaltigste nach den verschiedenen Gegenden und Lokalitäten, nach Alter und Gewohnheit. Gegenden wo die *Ascaris* am liebsten vorkommt sind gewöhnlich feuchte Niederungen, wie die Nijlthäler Aegyptens (Bilharz), die feuchten Küstendistrikte Schwe-

dens: Smaland, Halland, Schonen, die Umgebung von Zittau, welche den Ueberschwemmungen der Neisse un-
Manda und die Gegend von Glauchau, welche den Ueber-
schwemmungen der Mulde ausgesetzt ist (Küchen-
meister l. c. I., p. 233). Es ist vorzüglich das kindliche
Alter und die ländliche Bevölkerung, welche am meisten
an den Spulwürmern leiden. Da es wahrscheinlich ist,
dass die Zwischenträger der *Ascaris* niedere Thiere sind
und zwar jedenfalls solche, die einen weiten Verbreitungs-
bezirk haben, so sind es besonders Unreinlichkeit, Ge-
nuss roher, vegetabilischer Kost, welche Gelegenheit zur
Ansteckung bieten. Kinder an der Mutterbrust werden
fast gar nicht von den Parasiten heimgesucht, aber schon
mit dem dritten Jahre wird der Wurm häufig und bis
zum zehnten Jahre dürfte mehr, als die Hälfte aller
Kinder an Spulwürmern gelitten haben. Unreinliche
Geisteskranke leiden sehr häufig an ihm; nach Vix waren
unter 30 Individuen keines frei, während von Gesunden
und leichten Geisteskranken nur 8 % daran litten. In
Neger, besonders die amerikanischen sind in hohem Grade
von ihnen heimgesucht (Bajon, Dazille, Thomsen,
Dyer), was in ihren Lebensverhältnissen eine leichte
Erklärung findet. Die meisten Fälle von *Ascaris*-Leiden
kommen im Spätherbst vor, was schon Hippocrates
bekannt war und jedenfalls daher kommt, dass der Sommer
mit seinen vegetabilischen Produkten am häufigsten Gelegen-
heit zur Ansteckung giebt. Der Spulwurm lebt bei
der Regel nicht über eine Anzahl von Monaten bei
Menschen; selten und wohl nur in Folge mehrfacher
Einwanderung leidet ein Individuum Jahre lang an Spul-

irmern. Der Parasit lebt in der Regel zu mehreren, häufig zu Dutzenden neben einander, kommt aber auch in einzelnen Fällen in bedeutender Menge vor. So sah Freyer einem $\frac{5}{4}$ Jahre alten Kinde in kurzer Zeit 400 abgehen; Basserde trieb einem 82jährigen Greise 500 ab; Volz sah bei einem Kinde über 800 und Ulricher 900 binnen vier Wochen abgehen; eine Frau gab ihre Wochen lang täglich zwischen 23 und 49 von sich (Brera) und ein Knabe binnen 5 Monaten 2500 ab (etit), die noch dazu sämmtlich durch Mund und Nase abgingen. Der normale Aufenthaltsort des Spulwurmes ist der Dünndarm.

Die *Oxyuris vermicularis*, schon Hippocrates, Celsus und Aristoteles unter der Bezeichnung *Ascaris* bekannt, ist eben so verbreitet, als der vorige Parasit. Auch sie leiden gleichfalls vorzugsweise jüngere Individuen an demselben. Die Männchen sind seltener, als die Weibchen und zwar nach Zenker in einem Verhältnisse, wie 110:12, nach Leuckart (l. c. II., p, 289) wie 9:1. Das spätere Alter ist nicht ganz frei von Madenwürmern, es giebt selbst Individuen, die ihr ganzes Leben lang, und continuirlich, bald mit Intermissionen von kürzerer, bald längerer Dauer, dieselben beherbergen. Da die Larven direkt durch die Eier im Menschen zur Entwicklung gelangen, diese aber bei ihrer grossen Kleinheit und dem häufigen Vorkommen des Parasiten leicht überall hin verbreitet werden, so ist es erklärlich, warum diese Würmer nicht so streng an bestimmte Lebensweise gebunden sind, obgleich ihre Einfuhr durch Unreinlichkeit und Genuss roher Vegetabilien jedenfalls er-

leichtert wird. Doch auch die penibelste Reinlichkeit und grösste Abstinenz sichert nicht vollkommen. Bei Säuglingen sind unsere Würmer noch nie beobachtet, was aber gelegentlich schon im zweiten und dritten Lebensjahre, obwohl sie in der Regel erst vom 5. oder 6. Jahre an massenhaft auftreten. Nach einigen Beobachtungen sind die Madenwürmer im Frühjahr am häufigsten, nach andern im Herbst; da der Sommer der Ansteckung am günstigsten ist, das Uebel sich aber durch Selbstinfektion mehr und mehr verschlimmert, so möchten wohl im Herbst die meisten Fälle von Oxyuriskranken vorkommen. Die Würmer bewohnen den Dickdarm, besonders die unteren Partien, finden sich aber auch gelegentlich im Coecum und selbst im Dünndarm. Am Abend pflegen die Würmer zum Theil aus dem After auszuwandern und sich in dessen feuchter Umgebung zu bewegen. Die Würmer sind oft in unglaublicher Menge vorhanden; berichtet Vix von einem Irren, dessen ganzer Dickdarm pelzartig mit Oxyuren besetzt war und Kothballen erhielt, die zum grössten Theil aus Würmern bestanden. Oppolzer sah von einem Oxyuriskranken nach 40jährigem Leiden unter heftigem Tenesmus täglich mehrere Male einen Wurmballen von ansehnlicher Grösse abgehen.

Der *Dochmius duodenalis* lebt ausschliesslich im Dünndarm des Menschen, besonders den oberen Partien und gehört in den Tropenländern wahrscheinlich zu den verbreitetsten Helminthen. Zuerst von Dubini in Italien entdeckt (1838), wo er jedoch nur selten vorzukommen scheint, wurde derselbe später in den Nielländern massenhaft gefunden (Pruner, Bilharz, Griesinger).

uerdings von Wucherer auch in Brasilien gesehen. esseits der Alpen dürfte er gänzlich fehlen, doch mmen nahe verwandte Formen auch hier beim Hunde, chse, Dachse und Ochsen vor. Da die Embryonen im schlammigen Wasser leben, so ist es begreiflich, warum r *Dochmius duodenalis* ausschliesslich in warmen Län- rn gefunden wird: nur wo der Mensch, von Durst ge- hält, sein Trinkwasser aus schlammigen Pfützen und reinen Cisternen zu schöpfen pflegt, sind die Bedin- gen für ein massenhaftes Uebertragen gegeben. Die ürmer bewohnen vorzüglich das Jejunum (Bilharz) d sind hier zwischen den Querfalten der Schleimhaut t ihrem Kopfende derart befestigt, dass man fast Ge- lt anwenden muss, sie zu lösen. Die Würmer besitzen ntlich einen blutgefüllten Darm und beissen sich t ihrem Kopfende in die Schleimhaut fest.

Der *Trichocephalus dispar* bewohnt die hintern Par- en des Darmes, besonders den Blinddarm, doch hat n ihn auch mitunter im Dünndarm, einmal sogar (Wrisberg) im Duodenum gesehen. Er ist während des ens mit seinem dünnen Vorderende in der Darm- leimhaut befestigt, was schon den älteren Helmintho- en bekannt war (Wrisberg, Goetze), obgleich man auf unsere Tage lehrte, dass die *Trichocephalen* frei Darne lebten (Bellingham). Vix hat in allen en, wo er bald nach dem Tode seciren konnte, ebenso e Bremser die *Trichocephalen* in der Darmschleim- t eingebettet gefunden, ebenso Leuckart, beim nschlichen Peitschenwurm sowohl, als bei dem des weines, Schafes und Kaninchens. Im Stuhlgange

findet man den Peitschenwurm nur selten, so da
 Bremser das Abgehen desselben geradezu in Abre
 stellen konnte; doch hat Davaine mehrere Fälle n
 spontan abgehenden Trichocephalen gesammelt. Ro
 derer und Wagler fanden unsern Parasiten am En
 des vorigen Jahrhunderts häufiger in einer Epidemie o
 sogenannten Morbus mucosus und hielten ihn für.
 pathognomonisches Zeichen dieser Krankheit. Lan
 Zeit glaubte man, dass er nur im Darne Thyphö
 existire, jetzt aber ist man zu der Ueberzeugung geko
 men, dass er weder mit dieser, noch mit einer and
 Krankheit des Darmes im Zusammenhang steht. Da
 Wurm gerade diejenigen Partieen des Darmes bewoh
 welche bei der Section von am Typhus Gestorbenen ei
 genauen Untersuchung unterzogen werden, so ist
 häufige Auffinden desselben in diesem Falle leicht
 klärlich und das um so mehr, da der Speisebrei, welc
 in dieser Region schon dicker und resistenter wird, du
 den diarrhöischen Typhusstuhl entfernt ist und daher
 schmutzig gefärbten Würmer weniger leicht der Un
 suchung entgehen.

Symptomatologie.

Die Erscheinungen, welche die Darmwürmer
 vorrufen, sind nach der Individualität des heimgesuch
 Organismus sehr verschieden. Während in vielen Fä
 jedes Symptom von der Anwesenheit der Würmer fe
 erregen sie in anderen, selteneren Fällen die ernstlich
 Beschwerden. Dies gilt auch im Besonderen von

Bandwürmern und im Allgemeinen ist die Furcht vor diesen Beschwerden, welche sie erregen sollen, gewiss übertrieben. Es giebt Personen, deren Klagen erst mit dem Augenblicke beginnen, wo sie die Anwesenheit eines Bandwurms entdecken, auch solche, die nach glücklich verstandener Bandwurmkur immer wieder die früheren Beschwerden fühlen und bei welchen man füglich von einer Hypochondriasis taeniosorum sprechen könnte. Ob die Beschwerden, welche der Bandwurm erregt, vielleicht zum Theil von einer durch ihn erregten Entzündung des Darmkanals herrühren, ist noch nicht entschieden; dass derselbe aber eine Entzündung des Darmkanals hervorzurufen könne, ist nicht von der Hand zu weisen, wie denn auch Leuckart (l. c. I., p. 107) bei der Anwesenheit der *Taenia marginata* im Darmkanal des Hundes nicht selten eine krankhafte Beschaffenheit der Darm-schleimhaut: Injection, Abstossung der Eepithelialschicht, selbst kleine Geschwüre vorfand, deren Abhängigkeit von der Anwesenheit des Parasiten ausser Zweifel stand, da sie immer nur circumscripirt, an den Stellen, wo sich der Wurm befunden, vorkamen. Die Beschwerden, welche der Bandwurm erregt, sind theils lokaler, theils allgemeiner Natur. Zur ersteren gehören besonders Verdauungsstörungen und kolikartige Schmerzen, die bald mehr, bald da sich fühlbar machen, namentlich im nüchternen Zustande wiederkehren, durch blande Speisen und Getränke aber wohl auf einige Zeit beschwichtigt werden. Dabei ist die Speichelsekretion in den meisten Fällen bedeutend vermehrt, so dass der Speichel aus dem Munde fliesst. Mitunter haben die Kranken das Gefühl, als

wenn sich etwas wellenförmig im Leibe zusammenzög
vielleicht aber nur dann, wenn sie wissen, dass sie ein
Bandwurm beherbergen (Niemeyer). In anderen sel
neren Fällen erträgt der Organismus die Gegenwart d
Parasiten schlechter, es treten Diarrhöen ein, besonde
nach dem Genuss salziger und gewürzter Speisen, w
durch, besonders bei schon von vornherein schwächliche
Individuen, namentlich Kindern und jungen Mädchen
die Ernährung leidet und sich ein bleichsuchtartig
Zustand mit den bekannten nervösen Symptomen dies
Krankheit ausbildet. Auch kann der Reiz, welchen d
Parasit auf die Darmnerven ausübt, auf andere Nerve
bahnen übertragen werden. So findet man bei Ban
wurmkranken Anfälle von Angst, unruhigen Schlaf, p
riodischen, habituellen, meist einseitigen Kopfschme
vage Schmerzen in den verschiedenen Körperteile
Ohrensausen, Blitzen vor den Augen, Schwindel, D
spnoë, krampfhaftes Husteln (Seeger), Ohnmacht
Sinnestäuschungen; ja Hypochondrie, Hysterie, Schw
muth, selbst klonische Krämpfe (Seeger), Epileps
Chorea und Geisteskrankheiten sind im Gefolge des Ban
wurms beobachtet und nach Abtreibung desselben ni
selten verschwunden, wie denn Davaine eine Anz
solcher Fälle beobachtet hat. Doch darf man, wo sol
schweren Störungen vorkommen im Bereiche des Nerv
systems keine allzugrosse Hoffnung auf Heilung mach
da in den meisten Fällen dieselben neben dem Ba
wurm vorkommen und nach der Abtreibung fortbesteh

Bei der Anwesenheit von Ascariden im Darmka
sind Störungen der Gesundheit im Ganzen selten.

einzelnen Fällen leiden die Patienten von Zeit zu Zeit an stechenden und reissenden Schmerzen in der Nabelgegend, an Appetitlosigkeit, Blähungsbeschwerden, Neigung zu Diarrhöen und Brechreiz. Alle diese Beschwerden sind aber leicht, werden besonders nach gewissen Speisen hervorgerufen und treten oft nur nach diätetischen Sünden auf. Hierzu gesellen sich bisweilen mancherlei sekundäre Erscheinungen, wie gedunsenes Aussehen, Blässe des Gesichts, erweiterte Pupillen, Schielen, Bohren in der Nase, Zähneknirschen während des Schlafes und andere Innervationsstörungen; ja selbst schwerere Leiden kommen in seltenen Fällen vor, wie ich selbst einmal bei einem spulwurmkranken Kinde eine halbseitige, intermittirende Parese zu beobachten Gelegenheit hatte, welche nach Abtreibung der Parasiten sofort und für immer verschwand. Offenbar rühren diese Erscheinungen daher, dass die Würmer durch ihre Bewegungen die Darmschleimhaut reizen und eine bald geringere, bald stärkere Injection derselben hervorrufen, die ebensowohl die Secretion der Darmhöhle alteriren, wie die Thätigkeit des Nervensystems in Mitleidenschaft ziehen. Die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Spulwurmdarmes haben bis jetzt nur wenig Berücksichtigung gefunden. Man sieht bei Sectionen so häufig Ascariden im Darm, ohne irgend auffallende Veränderungen, dass man leicht skeptisch wird und geneigt ist, wo solche wirklich vorgefunden werden, dieselben auf eine bloß zufällige Combination mit anderen Leiden zurückzuführen. Der Reiz, den die Würmer auf die Darmschleimhaut ausüben, ist aber je nach den von ihnen ausgeführten

Bewegungen verschieden: sind dieselben, wie gewöhnlich gering, so wird auch die Schleimhaut ihre normale Beschaffenheit bewahren, sind diese aber aus irgend einem Grunde kräftiger, oder knäueln sich die Würmer in grösserer Anzahl durch Verschlingung im Darne zusammen, und üben dadurch einen Druck auf die umgebenden Wände aus, so werden auch die Veränderungen nicht ausbleiben, eben so wenig, wie die Symptome der Helminthiasis. Leuckart (l. c. II., p. 252 ff.) fand bei Hunden und Katzen solche Injectionen nicht nur bei zahlreicher Anwesenheit von Würmern, sondern gelegentlich auch da, wo die Würmer vereinzelt vorhanden waren und zwar immer an circumscripten Stellen. Bei einer Anzahl Tauben, welche sämmtlich demselben Schlage angehörten und an Convulsionen gestorben waren, fand er den ganzen Darm der Länge nach mit *Ascaris maculosa* angefüllt, so dass kaum Platz für den Speisebrei übrig blieb. Die Ernährung hatte, da die Thiere insgesamt abgemagert waren, offenbar schon länger gelitten und die Darmhaut, soweit sie mit den Ascariden in Berührung war, war nicht allein geröthet, sondern zeigte auch an manchen Stellen deutliche Erosionen. Auch vom Menschen sind solche Fälle bekannt. Rilliet und Barthez (Leuckart l. c. II., p. 254 ff.) fanden bei spulwurmkranken Kindern die Darmwand nicht selten geröthet und die Schleimhaut aufgelockert; und zwar waren auch hier die Veränderungen auf die von Parasiten besetzten Darmstellen beschränkt. Goetze fand bei seinem plötzlich verstorbenen Kinde im Anfange des Dünndarms einen grossen Spulwurm, der an der Stelle wo er gelegen

einen rothen Entzündungsfleck verursacht hatte. Leroux sah bei einem kräftigen jungen Manne, der nach vierzehntägiger heftiger Kolik einem Krampfanfalle erlegen war, auf der Innenfläche des mit mehr, als 100 Spulwürmern besetzten Darmes zahlreiche kleine Blutpunkte, „Stichwunden“, die von einem rothen Hofe umgeben waren. Gefährlichere Reizungen der Darmhaut entstehen durch die Wurmknäuel, welche ähnliche Erscheinungen hervorbringen, wie harte Kothmassen, und leicht den Tod des betreffenden Individuums zu Wege bringen können. Bertonneau erzählt von einem 8jährigen Kinde, das, auf der Reconvalescenz von einer Angina maligna, plötzlich an Convulsionen und Erbrechen starb. Bei der Section fand man im Dünndarm zwei Wurmknäuel, die die Darmwand erheblich ausdehnten und die Schleimhaut in grösserer Ausdehnung zerstört hatten; vor und hinter den Ballen war ein blutiger Schleim angesammelt, der keinen Zweifel liess, dass die Affection schon während des Lebens bestanden hatte. Noch eclatanter ist der von Hoffmann beobachtete, von Mosler veröffentlichte Fall. Er betraf einen 15jährigen kräftigen Knaben, der eines Abends, nach Genuss einer tüchtigen Mahlzeit, plötzlich von Erbrechen und heftigen Schmerzen in der Nabelgegend befallen wurde. Weder Fomente und Opium, noch Klystiere und Ol. Ricini, noch die zuletzt angewandten Blutegel linderten den Schmerz. Am folgenden Morgen kann man durch Druck auf die sehr empfindlichen Bauchwandungen in der Ileocöcalgegend einen Tumor constatiren. Auf die Darreichung von Calomel und Infusum Sennae compositum erfolgen mehrere Stühle,

welche vorübergehend erleichtern, bis, unter wieder steigenden Schmerzen, Krämpfe und Delirien eintreten und gegen Mittag der Tod erfolgt. Die Section ergab, ausser Peritonitis, eine ziemlich scharf begrenzte Abschilferung und scharfe Röthung der Darmschleimhaut in einem kleinen Theile des Ileum und etwa einen Fuss darunter einige enorme, das Darmrohr fast vollkommen füllende Spulwurmballen, welche offenbar durch die gereichten Abführmittel etwas nach Abwärts gerückt waren.

Aehnliche, tödlich verlaufene Fälle erwähnen Compenon und Arnold. In anderen Fällen verläuft die Darmentzündung weniger acut, unter Erscheinungen, welche denen eines eingekeilten Bruches gleichen, in wieder andern kommt ein förmlicher Ileus zur Beobachtung. Gelangt der Spulwurm activ, oder durch wässriges Erbrechen in den Magen, oder noch weiter nach oben, so erfolgen die unangenehmsten Störungen; stetiger Brechreiz und Erbrechen, lästiges Kribbeln im Halse, Schlingbeschwerden nebst Fieber, selbst Delirien, welche durch Entfernung des Wurmes wie ein Blitz verschwinden. In anderen Fällen sind die Symptome geringer, oder fehlen ganz, nach Küchenmeister (l. c. I., p. 331) dann, wenn der Wurm krank und matt, ohne Fähigkeit sich zu bewegen, ist. Auch in die Gallenwege wandern die Würmer gelegentlich über, wie denn der Spulwurm überhaupt eine grosse Vorliebe zeigt, sich durch enge Oeffnungen zu zwängen. Man hat nämlich mehrmals zu beobachten Gelegenheit gehabt, dass die Thiere zufällig verschluckte Drahtösen auf ihrem Körper trugen; einmal fand man sogar einen Wurm, welcher durch zwei derartige Oesen

seinen Körper hindurchgezwängt hatte (Cobbold, Barwell, Pritschart, Williams). Davaine und Andere glauben, dass die Spulwürmer nur in die pathologisch erweiterten Gallenwege überwandern könnten, da die Dicke der Ascariden zu beträchtlich ($5-6^{mm}$) sei, um in die engen Gallenwege ($2-3^{mm}$) übertreten zu können. Allein die in den Gallengängen aufgefundenen Exemplare massen höchstens $175-200^{mm}$ (Guersant), in der Regel nicht mehr, als $130-150^{mm}$ und die von Bourgois in der Tiefe der Leber vorgefundenen waren nur $50-60^{mm}$ lang, so dass die Dicke, welche freilich nie gemessen ist, bei den grösseren Thieren 3^{mm} , bei den mittleren kaum $2,3^{mm}$ und bei den kleinsten weniger, als $1,3^{mm}$ betragen konnte (Leuckart l. c. II., p. 238). Bedenken wir nun weiter, dass die den Gallengang umgebenden Wände weich und nachgiebig sind, dass er selbst sich schon nach einem Verlaufe von etwa $12-15^{mm}$ um das Doppelte erweitert, so ist gar kein Grund vorhanden, warum der Spulwurm nicht auch in den normal weiten Ductus choledochus einwandern könnte. Die Würmer leben bisweilen längere Zeit in der Leber, wachsen auch dort, wie die Veränderungen in ihrem Umkreise beweisen, welche nicht schon vorher bestanden haben könnten, da die Beobachtungen von Leberspulwürmern grossen Theils Kinder betreffen (Frerichs), bei denen derartige pathologische Zustände in diesem Organe äusserst selten sind. Die Zahl der Ascariden in der Leber ist bisweilen mehrfach; Pellizari fand in einem Falle 2, im anderen 16; es giebt auch Fälle, in denen die Gallenblase allein 3—5 enthielt. Bei der Anwesenheit der Würmer an

diesem Orte finden sich, ausser den Erscheinungen der Gallenstauung, meist zugleich heftige Schmerzen in der Lebergegend, bisweilen auch Erbrechen und Convulsionen. Sind die Würmer in das Leberparenchym selbst eingedrungen, so entsteht nicht selten eine heftige Hepatitis mit Abscessbildung und dessen Folgen, doch giebt es auch Fälle, in denen keinerlei Zeichen einer Leberaffection vorhanden waren. Auch durch die Darmwände wandern die Würmer aus. Man findet bei Sectionen bisweilen einen, oder mehrere Spulwürmer frei in der Leibeshöhle (Mangeon, Duben u. A.), und zwar ist der Fund mitunter rein zufällig, kein Symptom hat während des Lebens die Anwesenheit der Würmer verrathen, während in anderen Fällen eine rasch tödlich verlaufende Peritonitis, die Folge des Uebertritts fremder Körper in die Leibeshöhle vorausgegangen war. Oftmals findet sich in solchen Fällen eine grosse Anzahl von Löchern in den Wandungen des Darmkanals und zwar fanden sich unter 15 von Davaine gesammelten Fällen 6 Mal Löcher im Magen, ebenso oft im Dünndarm und dreimal solche im Coecum. In der Regel trugen die Löcher, auch bei sonst gesundem Darm, eine deutlich geschwürige Beschaffenheit. Wo die Zeichen einer vorhergegangenen Peritonitis fehlen, da werden die Würmer wohl erst nach dem Tode den Darm verlassen. Noch häufiger ist das schon von Hippocrates beobachtete Vorkommen von Wurmasscessen an der Bauchwand, Geschwülsten von meist mässigem Umfang, die, unter den gewöhnlichen Zeichen der Abscessbildung entstanden, bald früher, bald später nach der Eröffnung mit dem Eiter einen, oder mehrere

Spulwürmer entleeren. In der Regel tritt auch eine verschieden grosse Menge Speisebrei, oder Koth mit aus. Die Reaction des Organismus war in den beobachteten Fällen nur mässig und ein übler Ausgang selten. Die Abscesse bilden sich fast immer in der Nabel- und Leisten-gegend: in den von Davaine gesammelten Fällen fanden sie sich 19mal am Nabel, 21mal in der Leisten-gegend, 7mal an andern Stellen des Leibes. Man wird deshalb zu der Vermuthung gedrängt, dass es sich vielleicht um einen geringen Darmvorfall gehandelt hat; und dies wird durch die Statistik fast zur Gewissheit erhoben. Die Wurmabscesse am Nabel kamen fast nur bei Kindern vor (15:4), während die der Leisten-gegend fast nur bei Individuen über 15 Jahre vorkamen (19:2).

Nach der Ansicht Davaine's ist das Vorbrechen des Wurmes immer secundär, es hat immer eine Darm-fistel präexistirt. Wo schon länger eine solche bestanden, unterliegt das gewiss keinem Zweifel, wo der Wurm aber gleich mit dem Entstehen der Fistel nach Aussen bricht, ist auch eine andere Erklärung zulässig. Bekanntlich erregt die *Filaria medinensis* durch eine gewisse Stabilität ihrer Lage und einen andauernden Druck auf dieselbe Stelle einen Abscess.

Da die Bewegungen der Spulwürmer nun im Allgemeinen gering sind (Leuckart l. c. II., p. 243), so wird die Stetigkeit der Lage derselben noch zunehmen, wenn sie einen Stützpunkt finden. Die vorgefallene Darmschlinge ist aber immer, mag sie auch noch so klein sein, gross genug, um den Kopf des Wurmes aufzunehmen; da dieser aber eine grosse Rigidität besitzt,

so wird eine Lageveränderung nur selten eintreten. Der übrige, gegen die Darmwand angepresste Körper wirkt vermöge seiner Elasticität wie eine Feder und drückt den Kopf fest auf die Schleimhaut der Bruchstelle und die darüber liegenden Körperdecken; der Druck, welcher die ohnehin schon gezernte Bruchstelle trifft wird hinreichen, eine Entzündung, endlich eine Abscessbildung hervorzurufen. Rechnen wir hierzu noch die geringe Gefährlichkeit der Wurmabscesse und den Umstand, dass nirgend einer Brucheinklemmung Erwähnung geschieht, so ist diese Erklärung Leuckart's (l. c. II., p. 243 ff.) durchaus nicht so unwahrscheinlich und mag, wenn auch nicht für alle Fälle, doch für eine Anzahl derselben richtig sein. Vielleicht wirken die Würmer auch activ bei einer Perforation des Darmes durch ihre Zahnleisten, indem sie den Darm benagen. Für diese Ansicht sprechen sich aus: Spiegel, Andry, van Doeveren, während Pluter, Rudolphi, Bremser, Rokitanski, Bamberger und Küchenmeister (l. c. I., p. 333) sich gegen dieselbe erklären. Für die Ansicht spricht jedenfalls die häufige Perforation des Dünndarms, welche sonst nicht so häufig ist. Nach Mondière und Siebold geschieht die Perforation dadurch, dass die Würmer mittelst ihres Kopfendes die Fasern aus einander drängen und sich durch dieselben hindurchzwängen. Freilich wandert eine Anzahl Helminthen auf diese Weise aus, allein diese sind entweder sehr klein, oder mit einem sehr verschiebbaren Körperparenchym ausgestattet, was beides nicht auf die Spulwürmer passt. Sie führen zur Unterstützung ihrer Ansicht an, dass sich keine Oeffnungen

en nachweisen lassen (Mondidière). Allein die Oeffnungen sind wohl übersehen, oder waren schon vernarbt. Würmer können auch, statt nach Aussen durchzugehen, in die Pleura (Luschka), in die Milz (Maier) oder andere Organe gelangen. In die Blase können sie gelangen bei einer Fistel (Davaine, Alghisi), ebenso in den Uterus (Bedel). Payre fand 3 Würmer im Rückenmark eines Menschen, der an einem Psoasabscess starb; Minaglia sah einen solchen in den Halsmuskeln, in es durch einen Fistelgang aus dem Pharynx gelangt war. In der Tuba Eustachii sind die Würmer einmal beobachtet worden, bei einer Leiche (Winslow) und bei einem Manne während des Lebens, der unter heftigen Convulsionen zusammenstürzte (Brunneau). Die *Oxyuris vermicularis* erregt, wo sie in geringer Anzahl vorhanden, meist keine Beschwerden. Ist sie in grosserer Anzahl vorhanden, so bleibt auch die Beschaffenheit der Darmschleimbaut nicht normal, sie röthet sich, entzündet und bedeckt sich mit einer ansehnlichen Masse aus glasigen Schleimes, der mitunter blutig gefärbt ist. Auch die den Mastdarm umspinnenden Venen nehmen an den Veränderungen Theil; sie sind stark mit Blut gefüllt und erweitert, wie bei Hämorrhoidalleiden. Auch der After zeigt Röthung, Schwellung und Schleimabsonderung, bisweilen selbst zahlreiche Ecchymosen, welche theilweise von dem ungestümen Bohren und Reiben der Kranken herrühren, was die Würmer bei ihrer abendlichen Wanderung in die Umgebung des Afters durch die unerträgliche Jucken hervorrufen. Wandern die Würmer in die Vulva und Vagina über, so beobachtet

man auch hier Röthung, Excoriationen, besonders an Clitoris und den kleinen Schamlippen, Pruritus, so leukorrhöische Absonderungen. Die Bewegungen der Würmer erregen auch in der Scheide ein heftiges Kitzeln und Jucken und fordern die Kranken auf dem zu steuern, wodurch gar leicht aus Gewohnheit Onanie hervorgeht. Selbst nymphomanische Erscheinungen treten bisweilen auf, wie sie Becker sogar bei einer 70jährigen Frau beobachtete. Auch durch directe Reizung der Samen- und Nerven wirken die Oxyuren auf die Genitalorgane sowohl bei männlichen, als bei weiblichen Individuen, wodurch schon im kindlichen Alter (Lallemand, Lipp) anhaltende Erectionen, häufig mit unangenehmen Gefühlen, selbst lancinirenden Schmerzen, entstehen. Bei älteren Individuen treten erotische Träume und häufige Samenergüsse ein und nicht selten wird auch hier Veranlassung zur Onanie gegeben. Vix giebt an bei manchen Geistesstörungen, besonders solchen mit intermittirendem Charakter und starker geschlechtlicher Abhängigkeit, nie vergebens nach Oxyuren gesucht zu haben. Von anderer Seite will man auch besonders tobsüchtige Delirien von kurzer Dauer, die reflectorisch durch Clitorisreiz entstanden seien, beobachtet haben (Friedreich). Die Aerzte der Salpêtrière nehmen sogar, veranlasst durch mehrere zugleich vorgekommene Fälle, (1808) eine *Mania verminosa* an. Auch zu Veitstanz und epileptischen Krämpfen sollen unsere Würmer bisweilen Anlass geben, wenngleich seltener, als *Ascaris* und Bandwürmer (Davaine, Romberg, Vix). Durch die anhaltende Schlaflosigkeit wird bei längerer Dauer der Krankheit

liesslich die Ernährung angegriffen; Vix fand bei den meisten von Würmern heimgesuchten Kranken, die freilich nicht alle an Oxyuren litten, die geringsten Gehechtsbefunde und beobachtete bei 70 % ödematöse Erscheinungen; Hervieux kannte einen Mann, der seit dem 15. Jahre an Oxyuren litt und endlich an einer kräftenden Dysenterie zu Grunde ging.

Der *Dochmius duodenalis* erregt, wenn er in grösserer Menge vorhanden ist, oft so copiöse Blutungen, dass man ganze inficirte Darmstück mit Blut gefüllt sieht. Nachdem einmal die ungemeine Verbreitung der *Dochmien* in Aegypten und der durch sie bedingte Blutverlust erkannt war, konnte über die klinische Bedeutung des Wurmes kaum noch ein Zweifel sein. Die täglich wiederholten Blutentziehungen müssen schliesslich nothwendig einen anämischen Zustand hervorrufen und dies um so rascher und intensiver eintreten, je grösser die Anzahl der beherbergten *Dochmien* ist. Die einmal entstandene Anaemie verschlimmert das Uebel immer mehr, da mit Abnahme der gerinnbaren Bestandtheile das Blut immer schwerer zum Stehen kommt. Schon Langem ist in den Nielländern eine Krankheit bekannt, welche die Erscheinungen einer mehr oder minder tiefen Chlorose an sich trägt, an der mindestens $\frac{1}{4}$ der ganzen Bevölkerung leidet (Griesinger), und von welcher auch die höheren Schichten der Gesellschaft nicht verschont bleiben. Von den Franzosen für eine Gastritis genommen, wurde von Griesinger, der die Krankheit mit besonderem Interesse beobachtete und sie namentlich als Folge anderer Leiden zu betrachten geneigt

war, bei der Section eines eclatanten Falles plötzlich ihre wahre Natur erkannt. Die leichteren Grade der sogenannten aegyptischen Chlorose äussern sich durch Erbleichen der Hautdecken und Schleimhäute, Nonnengeräusch in den Ingularvenen, Neigung zu Herzpalpitationen, leichte Ermüdung bei körperlichen Anstrengungen, kurz die Symptome fehlerhafter Blutmischung. Da sind die Kranken wohlgenährt, oft sogar ziemlich fett, aber von gedunsenem Aussehn. Die kleinen Verdauungsstörungen, die auch bei der gewöhnlichen Chlorose nicht fehlen, haben Anfangs nur eine geringe Bedeutung. In längerem Bestande geht das Leiden in die schweren Formen über. Die Kranken magern jetzt ab, bekommen Oedeme, besonders an den unteren Extremitäten und den Augenliddern, die Haut ist schmutzig-gelb, bei längerem mehr grau, die Conjunctiva ist bläulich-weiß, Lippen und Schleimhäute erscheinen blass, wie bei einem Todten. Grosse Schwäche und Mattigkeit, welche bei jeder Bewegung steigert, macht die Kranken träge und apathisch; dabei treten Gliederschmerzen auf, bald heftige, entweder andauernde, oder doch bei jeder Bewegung sich von Neuem einstellende Herzpalpitationen. Den zweiten Herzton hört man oft schon auf mehr als Schritt Entfernung; bei der Auskultation vernimmt man bald beide Töne laut und klingend, bald den ersten Trikelton kurz, schwach oder unrein, bald ein systolisches blasendes Geräusch. Der Puls ist sehr frequent und klein, in allen grösseren Arterien hört man ein Rasseln in der Vena jugularis lautes Rasseln und Tosen. In schweren Fällen finden sich sogar alle Zeichen eines orga-

nen Herzfehlers: Hypertrophie, Insufficienz der Mitralis der Aorta, Stenose. Dabei leiden die Patienten oft an Schwindel, Schmerz in der Stirn, Ohrensausen. Die Diarrhoe wird schon nach wenigen Schritten sehr hochgradig. Die Fäces sind nicht blutig, was theils von der kopiösen Fäkalbrei der Aegypter, die meist von Pflanzenkost leben, theils von dem Sitze des Leidens im Dickdarm herrührt. Bei der Obduction findet man selten verbreitete Darmaffectionen, was wohl von der relativen Bewegungslosigkeit des Thieres herrührt. Bisweilen sieht man flach erhabene livide Flecke durch die Schleimhaut schimmern, von 6—8^{mm} Durchmesser, welche von kleinen, mit Flüssigkeit erfüllten Höhlen zwischen Mucosa und Muscularis durchlöcheren und je einen aufgerollten Wurm enthalten. Im Uebrigen findet man wässrige Infiltrationen an den verschiedensten Stellen und die übrigen Zeichen der Anämie. Das Herz lässt oft die Veränderungen, welche in oben angegebenen Fehlern entsprechen, wahrnehmen, während Milz und Nieren sehr oft amyloid entartet, aber die Milz, noch häufiger die Leber atrophirt sind.

Der Trichocephalus dispar bringt in den meisten Fällen keinerlei Symptome hervor, was wohl grösstentheils daher rühren mag, dass derselbe gewöhnlich nur in geringer Menge im Darme vorzukommen pflegt. Bei Anwesenheit grösserer Massen werden jedenfalls auch die Symptome nicht ausbleiben. So erzählt Pascal von einem 4jährigen Mädchen, das unter Hirnerscheinungen starb und „une quantité prodigieuse“ von Trichocephalen im Coecum und Colon nachwies. Aehnliche Fälle, wo Hirnerscheinungen vorhanden waren, erwähnen Wunder-

lich und Gibson. Pascal giebt als ziemlich constant Symptome einer grösseren Anzahl Trichocephalen: Kopfschmerz, Röthung des Gesichts, Vorspringen Augen, kleinen intermittirenden Puls, Schmerzen Unterleib. Die Darmschleimhaut zeigt an den von einer grösseren Menge von Trichocephalen bewohnten Strecken sehr allgemein die Zeichen eines chronischen Katarrhs und in der Mehrzahl der Fälle Geschwüre, besonders der Ileocöcalklappe (Vix). Letztere finden in der Befestigung der Würmer in der Schleimhaut eine leichte Erklärung.

Diagnose.

Die Symptome, die man als Zeichen für das Vorhandensein von Würmern ansieht, bekunden eigentlich weiter nichts, als das eine Reizung in der Schleimhaut des Darmes stattfindet, eine Reizung, die aus den mannigfachsten Ursachen, wie z. B. aus der Anhäufung von unverdaulichen Stoffen, aus krankhaft beschaffenen Sekretionen, oder aus einem pathologischen Zustande der Membran selbst entstanden sein kann. Ein sicheres Zeichen für ihr Vorhandensein giebt nur der Abgang eines Exemplares, sei es ganz, sei es theilweise, oder der Nachweis der Eier im Stuhle. Auch das Abgehen von Würmern ist noch kein sicheres Zeichen, dass die vorhandenen Symptome, — deren Heftigkeit allerdings durch diese Complication gesteigert werden kann — durch sie allein hervorgerufen werden; die Anwesenheit von Würmern kann lediglich eine accidentelle Erscheinung sein, während die eigentliche Quelle der Leiden

einer krankhaften Beschaffenheit der Schleimhaut des Darmes, oder auch wohl in dem abnormen Zustande eines anderen Organes zu suchen ist. Deshalb kann die Abreinerung eines Wurmes allein niemals einen Grund abgeben, um blindlings mit anthelmintischen Mitteln auf loszufahren, oder den Fall gar für geheilt zu erkennen, weil Würmer abgegangen sind. Besonders gilt es für die schwereren Leiden, wie Epilepsie, Chorea, Störungsstörungen, welche in der bei weitem grösseren Zahl von Fällen, auch nach dem Abtreiben der Würmer, fortbestehen. Sind Symptome des Hydrocephalus vorhanden, so beruhige man sich nicht mit dem Abgange der Würmer, habe vielmehr ein wachsames Auge auf die Kinder, denn gerade in dieser Hinsicht sind traurige Erscheinungen gar nicht so selten. Tritt Gallenstauung oder Leberentzündung bei Anwesenheit von Spulwürmern oder Bandwürmern ein, so kann man immerhin auch an die Möglichkeit einer Abhängigkeit des Leidens von diesen denken, doch wird man schwerlich in solchem Falle über eine blosse Vermuthung hinauskommen. Sind bei Anwesenheit eines Bandwurmes Hirnerscheinungen vorhanden, so muss man immer noch an eine Selbstinfection mit *Cysticercus cellulosae* denken. Auf die Anwesenheit von Doehmien wird bei den höheren Graden der ägyptischen Chlorose, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Lebensweise der Patienten, immer mit ziemlich grosser Sicherheit zu schliessen sein.

Prognose.

Die Prognose quoad vitam ist durchaus günstig bei Anwesenheit von Würmern, ebenso quoad valetudinem completam.

Die Abtreibung durch geeignete Mittel wird durch sie hervorgerufenen Beschwerden bald heben. Bei den Taenien ist sie für *Taenia solium*, wegen Möglichkeit einer Selbstinfection mit *Cysticercus cellulosae* günstiger, günstiger für *Taenia mediocanellata*, wo die Gefahr nicht zu befürchten ist, doch widersteht letztere hartnäckiger den Abtreibungsversuchen. Schlechter ist die Prognose bei den durch *Dochmius duodenalis* hervorgerufenen Leiden. Nur wo es möglich ist, den Patienten in günstigere äussere Verhältnisse zu versetzen, ist Hoffnung vorhanden auf gänzliche Genesung, doch Besserung der vorhandenen Beschwerden. Eine profuse Darmblutung kann oft plötzlich dem Leben ein Ziel setzen; oder es treten, auch ohne dass Dysenterie sich hinzu gesellt, profuse Diarrhoeen ein, welche den angewandten Mitteln hartnäckig widerstehen und durch Aufreihung der noch vorhandenen Kräfte den Tod beiführen.

Therapie.

In Betreff der Prophylaxis ergeben sich die anzuwendenden Massregeln aus dem, was wir über die Entwicklungsgeschichte und das Vorkommen der einzelnen Helminthenarten gesagt haben, von selbst. Da der *Cysticercus cellulosae* hauptsächlich beim Schwein,

Cysticercus der *Taenia mediocanellata* hauptsächlich beim Rinde vorkommt, so ist der Genuss des rohen Fleisches dieser Thiere zu untersagen, auch Köchinnen und Metzger einzuschärfen, dass sie das Messer, womit sie das Fleisch zerschnitten, nicht in den Mund nehmen; und sind letztere ausserdem anzuhalten, dass sie das Messer, mit dem sie rohes Fleisch zurichten, nicht zum Abschneiden des Schinkens und der Wurst benutzen. Ueber die Einwanderung der *Bothriocephalen* weiss man noch nichts Bestimmtes; da es jedoch wahrscheinlich ist, dass ein Fisch uns dieselben liefert, so ist bei Bereitung dieser die nöthige Vorsicht zu empfehlen. Da die *Ascariden* uns wahrscheinlich durch niedere Thiere, die *Oxyuren* wahrscheinlich, die *Trichocephalen* sicher durch die embryonenhaltigen Eier zugeführt werden, so leuchtet es ein, dass hier unbedingt schützende Massregeln nicht gegeben werden können; doch ist vor Allem vor Unreinlichkeit, Genuss roher Vegetabilien, Genuss verdorbenen Mehles und Brodes zu warnen. Um sich vor der Infection mit *Dochmius duodenalis* zu schützen, darf man kein Wasser aus schlammigen Pfützen und Cisternen zum Trinken schöpfen.

Aus der grossen Anzahl früher als wurmwidrig empfohlener, zum Theil mit gutem Erfolg angewandter, zum Theil höchst unzuverlässiger Mittel wollen wir hier nur die heftiger wirkenden überhaupt erwähnen; namentlich das *Oleum Chaberti* (Bremser) Morgens und Abends zu 2 Kaffeeelöffel, das *Oleum animale Dippelii* und das *Calomel*, welche man gegen Würmer überhaupt, sowie gegen Bandwürmer insbesondere braucht. Dann

wurden auch tonische und bittere Arzneien vielfach angewandt, welche jetzt, ebenso wie die oben erwähnten obsolet geworden sind. Die jetzt gebräuchlichen Wurmmittel, welche auch zum Theil den älteren Aerzten schon bekannt waren, sind folgende:

Zur Entfernung der Ascariden und Trichocephalen haben, mit Recht, die Flores Cinae und ihre Präparate, das Santonin und das Natron santonicum einen guten Ruf. Die Zittwerblüthen giebt man bald in Latwergenform, bald in Form der Wurmkekuchen, bald auch gröblich gestossen auf ein Butterbrod, oder man wendet das aus ihnen bereitete ätherische Extract an. Die bekanntesten Wurmlatwergen sind die von Störk und Bremser; in der letzteren kommen, ausser Zittwerblüthen, auch noch die früher als Wurmmittel vielfach gerühmten Flores Tanaceti vor.

Die Störk'sche Latwerge besteht aus folgenden Substanzen:

Rp. Flor. Cinae grmm. 8,0, Rad. Valer. minut. pulv. grmm. 4,0, Rad. Jalap. pulv. grmm. 0,2, Oxymellis squillit. q. s. ut. f. Electuarium. D. S. Alle 2—3 Stunden 1 Theelöffel voll.

Die Bremser'sche Latwerge:

Rp. Flor. Cinae, vel Tanaceti vulgaris ruditer contus. grmm. 15,0, Pulv. Rad. Valer. grmm. 7,5, Pulv. Rad. Jalap. grmm. 2,5, Kali sulph. grmm. 6,0—8,0; Oxymellis squillitici q. s. ut. f. Electuarium. D. S. 2—3 Mal tägl. 1 Kaffee-
löffel voll.

Von dieser Form der Darreichung, ebenso von den

Wurmkuchen und dem Extract, ist man jetzt fast gänzlich zurückgekommen, weil die Präparate der Zittwerblüthen bedeutend angenehmer zu nehmen sind. Will man die Blüthen durchaus reichen, so gebe man grmm. 2—4 gepulvert mehrmals täglich auf ein Butterbrod, oder auf Brod, welches mit Syrup oder Honig bestrichen ist und lasse an jedem dritten oder vierten Tage ein Abführmittel folgen (Clarus).

Das Santonin ist, wenn rein, geschmacklos, da es sich im Munde nicht lös't, schmeckt in Alkohol gelös't bitter und lös't sich im warmen Wasser wenig, in fetten Oelen aber leicht. Es ist geruchlos, reagirt schwach sauer, verbindet sich desshalb leicht mit Alkalien und gilbt im Sonnenlicht. Man kann dasselbe zu gramm. 0,06,2—0,12 mehrmals (3—4) täglich mit Zucker gemischt auf eine Butterschnitte gestreut, oder in einem Eigelb mit Zucker reichen (Küchenmeister) und lässt alle 3—4 Tage ein leichtes Laxans folgen. Denen, welche leicht Oele nehmen, giebt man es in Ol. Ricini (grmm. 0,12—0,24 : grmm. 30) kaffeelöffelweise bis zur abführenden Wirkung. Sehr zu empfehlen sind auch die Trochisci santon. (grmm. 0,06,2—0,12), besonders die aus unentöltem Cacao bereiteten. In einzelnen Fällen sind, selbst nach kleinen Gaben des Mittels Krampfanfälle und hartnäckige Obstruction beobachtet. Gelbsehen, Blau- und Grünsehen kommen gar nicht so selten vor, verschwinden aber schon nach kurzer Zeit wieder. Der Urin kann hierbei roth, selbst himbeerfarben werden, doch ist kein Gallenfarbstoff in ihm nachzuweisen. Die Farbenerscheinung ist desshalb jedenfalls eine Wirkung

des Mittels auf das Gehirn, die Centralenden des Opticus und die Retina. Um alle üblen Wirkungen zu vermeiden, dürfte es gerathen sein, das Mittel nur ein um den anderen Tag zu reichen.

Das von Hautz bereitete Natron santonicum ist bedeutend gefahrloser und wirkt eben so sicher. Richter und Küchenmeister (l. c. I., p. 343) haben nie schädliche Nebenwirkungen beobachtet; und doch hat letzterer es bei Erwachsenen selbst zu grmm. 0,5—0,6 zwei Mal täglich gegeben. Da es von Säuren leicht zersetzt wird, so giebt man es am besten allein, oder setzt es zu Aq. Laxativa Viennensis. Die Dosis ist grmm. 0,12 — 0,4 einige Tage lang Morgens und Abends. Ein Abführmittel muss auch hier gereicht werden, wenn das Natron santonicum nicht gleich mit einem solchen verbunden wurde. Der Zittwersamen und seine Präparate wirken so sicher, dass alle anderen Wurmmittel bei Anwesenheit von Ascariden überflüssig sind.

Zur Entfernung der *Oxyuris vermicularis* reicht man mit inneren Mitteln nicht aus. Heftige Diarrhöen und Abführmittel entfernen die Würmer nur theilweise, vernichten sie aber nicht vollkommen. Man kann ihnen nur durch Clystiere wirksam beikommen. Schon Clystiere aus kaltem Wasser sind sehr wirksam, besonders wenn man etwas Essig zusetzt. Vielfach empfohlene Zusätze sind noch folgende: Kochsalz mit Oel; Oleum Chaberti, Oleum animale Dippelii. Andere loben Knoblauch-, Wermuth- oder Valerianainfuse in Clystierform. Sehr wirksam sind Clystiere mit Aloezusatz (Dujardin) mit Zusatz von Natron santonicum (grmm. 0,25—0,5

mit ein paar Tropfen Anisöl (Küchenmeister); in sehr hartnäckigen Fällen wendet man Sublimat an gramm. 0,01,5 auf ein Clystier, oder Argentinum nitricum gramm. 0,06,2—0,24. Mosler hat mit gutem Erfolge das Benzin in folgender Formel angewandt:

Rp. Benzini gramm. 1,25; Vitelli Ovi Nr. I.,
Aq. destillat. gramm. 120,0. Mf. Emulsio. D.
S. zu zwei Clystieren (l. c. p. 86).

In hartnäckigen Fällen ist es gut, sich statt der gewöhnlichen Clystierspritze des Klysopompes zu bedienen, dessen Ansatzrohr bis über die Flexura sigmoidea hinaufreicht (Griesinger). Zur Entfernung der in den Dünndarm eingewanderten Oxyuren ist es heilsam Natron santonicum innerlich zu reichen. Gegen das heftige abendliche Jucken sind Einreibungen von Unguentum Hydrargyri cinereum äusserst wirksam. Gegen Doehmius duodenalis sind von Griesinger Hydrarg. chloratum mite und Ol. Terebinthinae empfohlen. Letzteres wäre besonders zu empfehlen mit Ol. Ricini, oder mit Ol. Ricini und einigen starken Dosen Santonin, oder Natron santonicum (Küchenmeister l. c. I., p. 303).

Aus der grossen Masse gegen die Bandwürmer empfohlener Mittel wollen wir nur die jetzt gebräuchlicheren und wirksameren anführen.

Die Bandwurmmittel wirken besonders dann erfolgreich, wenn sie zur Zeit gegeben werden, wo freiwillige Proglottiden abgegangen sind; durch letzteres Moment zeigt sich nämlich die für die Abtreibung günstige Disposition an. Sehr gerathen ist es ferner der eigentlichen Abtreibung eine Vorkur voranzuschicken. Man lässt den

Kranken mässig leben und reinigt seinen Darm durch Ol. Ricini, oder andere leichte Abführmittel. Dann lässt man ihn einige Tage stark gesalzene Speisen, Sauerkraut, Häringe, Schinken, Häringssalat ohne Kartoffeln mit viel Zwiebeln und Zucker, bitteres Bier in mässiger Menge, herben Wein geniessen und verordnet zur Sommerzeit den fleissigen Genuss von Waldbeeren, Erdbeeren, Preisselbeeren und frischen Gurken.

Das Ol. Terebinthinae ist eines der sichersten Bandwurmmittel. Nach Küchenmeister (l. c. I., p. 111) sterben in mit ihm gemischten Eiweiss die Würmer binnen $1\frac{3}{4}$ Stunden. Es wirkt schnell und treibt den Parasiten in einem Stücke ab, erregt aber in den Dosen, worin man es zu reichen pflegt, leicht Blutstuhl, Tenesmus und Haematurie und zwar besonders leicht dann, wenn kein Stuhlgang erfolgt (Copeland). Da das Ol. Terebinth., wegen seines abscheulichen Geschmackes ausserdem schlecht zu nehmen ist, so ist es gerathen, nur im Nothfalle von ihm Gebrauch zu machen. Die Dosis ist grmm. 30—60 entweder auf einmal und allein, oder mit Honig zu einer Latwerge verarbeitet in zwei Malen Abends vor dem Schlafengehen.

Auch folgende Form ist sehr beliebt:

Rp. Ol. Terebinth. grmm. 30 cum Vit. Ovi
Numr. 2 subact. Sacch. albi grmm. 15,0.

Küchenmeister (l. c. I., p. 112) räth dasselbe Abends vor dem Schlafengehn zu grmm. 30 mit grmm. 30 Ricinusöl, 2—3 Stück Eidotter und grmm. 30 Honig verrieben auf 2—3 Mal in Zeit von 1— $1\frac{1}{2}$ Stunden zu reichen, Kindern die Hälfte.

Kousso, sive Flor. Brayerae anthelminticae wirkt nicht so sicher, wie man Anfangs zu glauben geneigt war. Bandwürmer sterben in einem aus ihm bereiteten Infus mit Eiweiss binnen einer Stunde. Das Mittel erregt leichte Uebelkeit, Erbrechen und starke Leibschmerzen und der abgehende Wurm ist in zahlreiche kleine Stücke getheilt, welche das Auffinden des Kopfes sehr erschweren (Küchenmeister l. c. I., p. 115). Man reicht das Mittel in Wasser, oder in einer Latwerge zu grmm. 15—30 in zwei Portionen und lässt, wenn nach 3 Stunden kein Abführen erfolgt, ein Laxans nehmen.

Raimann lässt grmm. 22,5 in Aq. frigida 24 Stunden maceriren, dann $\frac{1}{2}$ Stunde in dem Wasser kochen und das Infusodekokt, mit den Blüthen, in zwei Portionen nüchtern geniessen, worauf nach etlichen Stunden grmm. 30—60 Ol. Ricini gegeben wurden. Das Mittel wurde, auf diese Weise gereicht, gut vertragen und wirkte sicher.

Martius hat aus der Kousso ein Weichharz dargestellt, welches zu 2,5 grmm. mit 30 grmm. Honig gereicht wird und zwar zu verschiedenen Portionen in einem Zeitraum von 12—16 Stunden. Dasselbe ist ziemlich leicht zu nehmen und wirkt eben so sicher, wie das Mittel in Substanz.

Kamala, seu Rottlerae tinctoriae Glandulae wird zu grmm. 15 gereicht in Wasser, oder in Latwergenform, erregt gleichfalls leicht Uebelkeit und wirkt unsicherer, als die Kousso.

Die beiden letzteren Mittel wendet man am besten als Adjuvantia bei anderen Bandwurmmitteln an. Eine bekannte Formel ist folgende:

Rp. Kousso grmm. 20,0; Extracti Filicis aetherei grmm. 2,0; Kamalae grmm. 7,5; Mellis despumati q. s. ut. f. Boli Nr. 20. D. S. stündlich 6 Stück.

Die Radix Filicis maris ist besonders wirksam bei den Bothriocephalen, während sie bei den Taenien höchst unsicheren Erfolg hat. In einer Mischung von Extractum Filicis aethereum mit Eiweiss sterben die Taenien in $3\frac{1}{2}$ —4 Stunden (Küchenmeister l. c. I., p. 103). Man reicht das Mittel theils in Pulverform, Morgens nüchtern von grmm. 2—7,5 zu zwei bis drei Dosen, oder in Abkochung (Bicking), theils auch als ätherisches Extract, theils endlich als Oel (60—80 Tropfen Weishaar).

Sehr gelobt wird die Mischung von Extract und Pulver nach Peschier:

Rp. Extract. Filicis maris aether. grmm. 1,2 bis 2,0; Pulv. Rad. Filicis maris q. s. ut f. Pil. Nr. 20. D. S. in zwei Portionen eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen.

Am andern Morgen wird ein Laxans gereicht. Nach Major ist die grüne Wurzel und das aus ihr bereitete Extract sicherer, als die trockene Wurzel. Ein starkes Laxans muss immer nach dieser Kur gereicht werden.

Die Granatwurzelsrinde, Cortex Radicis Punicae Granati, ist ein sehr beliebtes und sicher wirkendes Bandwurmmittel. Die frische Rinde wirkt gelinder und sicherer, als die getrocknete; von der frischen gebraucht man grmm. 90, von der trockenen grmm. 60. Die ostindische, dickere Rinde soll besser sein, wie die euro-

sche. Die Darreichung in Pulverform, grmm. 0,7 bis 5 für Kinder, für Erwachsene grmm. 2,6 alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunde, bis 6 Pulver verbraucht sind, ist am wenigsten empfehlen. Sicherer wirkt das aus der Rinde bereite Dekokt. Buchanan lässt grmm. 240 frischer Rinde in 3 Pinten Wasser auf 2 Pinten einkochen und das Dekokt in kurzen Zwischenräumen tassenweise trinken; doch ist diese Ordination allzu energisch, es folgt heftiges Erbrechen mit Kolik und Durchfall. Breton lässt grmm. 60 von grmm. 540 auf grmm. 270 einkochen. Das Dekokt wird gleichfalls tassenweise getrunken, aber besser vertragen. Merat lässt Abends grmm. 60 frischen Rinde mit grmm. 600 Wasser infundiren, die Nacht über maceriren und am folgenden Morgen auf grmm. einkochen, dann coliren und gut ausdrücken. Das Dekokt wird in 3 Theilen binnen 2 Stunden getrunken. Bei der trockenen Rinde verfährt man auf dieselbe Weise; man lässt grmm. 60—120 durch 12 Stunden maceriren und dann 12 Stunden bei gelinder Temperatur von grmm. 600 auf grmm. 300 einkochen. Die frische Rinde hat zugleich eine abführende Wirkung, bei Gebrauch der trockenen muss immer ein Laxans zugefügt werden, oder man reicht es nachträglich. Das Dekokt bedeutende Uebelkeit und Erbrechen erzeugt, so ist es gerathen, zu versuchen, ob man nicht mit dem einfachen, viel milder wirkenden Infusum zum Ziele kommt (Niemeyer). Ausserordentlich wirksam ist das aus der frischen Rinde bereitete Extract, welches zu grmm. 30—60 gereicht wird (Waitz). Aehnlich wirkt das aus der getrockneten Rinde (grmm. 120—180) her-

gestelltes Extract (Küchenmeister l. c. I., p. 125). Man löst dasselbe in Wasser, oder giebt es, wo Brechneigung vorhanden ist, mit Honig als Latwerge. Folgende Methode wird von Küchenmeister sehr gelobt:

Rp. Rad. Punic. Grant. grmm. 180,0; Cort.
Rhamni cathart. grmm. 30,0, Aq. destill. grmm.
720,0. Liq. Kali caust. concentr. gutt.
Macera per horas 12—14, coquae leni calore
balneo vaporato per horas 24 ad rem. extr. D.

Umgeschüttelt früh nüchtern eine Obertasse, nach $\frac{3}{4}$ Stunden eine zweite. Die dritte bleibt reservirt und wird gereicht, wenn nach $1\frac{1}{2}$ Stunden der Wurm nicht abgegangen sein sollte.

Auch folgende Ordination ist erfolgreich:

Rp. Extract. Cort. Rad. Pun. Granat. quant.
adeptus si ex Rad. grmm. 120,0—180,0; aq.
destill. ferv. grmm. 180,0—240,0, Extr. I.
aeth. grmm. 1,2—2,0; Gutti grmm. 0,25—0,
Gabe wie oben.

Bei Erbrechen giebt man alle 10 Minuten 1 Esslöffel; um den Brechreiz zu mildern gurgelt der Patient mit süsser Milch, ohne sie zu verschlucken.

Ist 3 Stunden nach dem ersten Einnehmen kein Stuhl erfolgt, so reicht man ein Laxans, und zwar wenn man Taenia solium vermuthet Ol. Ricini, nach $\frac{1}{2}$ —1 Stunde einen Esslöffel, oder: Rp. Gutti grmm. 0,36—0,48; Pulv. Rad. Jalap. grmm. 0,7—1,0, was man im Nothfalle nach 2 Stunden repetiren kann (Küchenmeister l. c. I., p. 128). Bei Taenia mediocanellata reicht man: Rp. Hydr. chlor. mitis grmm. 0,25—0,

Pulv. Jalap. grmm. 0,7—1,0. M. D. S. Auf einmal.
 Meist genügt die Methode mit Extr. Rad. Pun. Granat.
 Auch bei *Taenia mediocanellata*, besonders, wenn man
 das angeführte Calomelpulver als Abführmittel nachgiebt.
 In hartnäckigen Fällen rath Küchenmeister (l. c. I.,
 S. 129 ff.) eine Kur mit Stannum zu versuchen, doch statt
 des sonst gebräuchlichen *Stannum raspatum anglicum*
 (grmm. 30), welches allzu nachtheilige Folgen hat und
 besonders ausserordentlich heftige Leibscherzen erregt,
 lieber das *Stannum galvanice praecipitatum* zu grmm.
 10 mit etwas Extr. Pun. Granat., Extr. Filicis aether.
 und Gutti und Jalappe in Latwergenform zu benutzen.

Auch die Pikrinsäure und ihr Salz, das *Kali picro-*
nitricum ist ein ziemlich sicheres Bandwurmmittel (vgl.
 Rosler l. c. p. 29—42). Man reicht es gewöhnlich in
 der von Friedreich angegebenen Formel:

Rp. *Kali picro-nitrici* grmm. 2,0; Pulv. Rad.
Jalappae grmm. 4,0; Extr. Glycyrrh. q. s. ut f.
 Pil. Nr. 32. D. S. tgl. 3mal 5 Stück.

Doch würden die vorerwähnten Mittel, besonders
 das Dekokt und Extract der Granatwurzelrinde darum
 den Vorzug verdienen, weil sie nicht so stark angreifen
 und nicht so leicht schlimme Complicationen herbei-
 führen. Das *Kali picro-nitr.* führt nämlich leicht, wenn
 nur in irgend beträchtlicherer Dosis gegeben wird,
 eine Reizung der Harnorgane herbei und darf des-
 halb Kindern, schwächlichen Individuen und solchen, die
 mit Nierenleiden behaftet sind, oder dazu incliniren unter
 keiner Bedingung gegeben werden. Ausserdem ruft es
 öfters, bisweilen sehr intensive Färbung der Haut hervor,

welche auch nicht von jedem Patienten mit Gleichmuth hingenommen wird, besonders, wenn man ihm nicht die Bestimmtheit Befreiung von seinen Leiden zusichern kann. Wir wollen jetzt noch einige Methoden mit selteneren Mitteln kurz erwähnen.

Schebti s. *Phytolaeca dodecandra*. Dasselbe wird wahrscheinlich durch die scharfen Kanten seines Gehäuse und die kleinen Stacheln an der Aussenseite. Neun Früchte sollen bei einem Erwachsenen genügen. Nach Küchenmeister (l. c. I., p. 109) soll das Mittel sehr unsicher wirken; er gab bei einem Kinde 10 Stück der Frucht; dennoch gingen nur einzelne Stücke Wurm ohne Kopf, ab.

Fructus Saoriae, die Früchte von *Moesa picta* (Hochstetter). Die Früchte sind beerenartig, $1\frac{1}{4}$ Linien Durchmesser, oberhalb der Mitte mit den stehenden Kelchzipfeln versehen und enthalten gegen 10 rothbraune, fast tetraedrische Samen (Walpers). Das Pulver der Samen wird in Erbsenbrei gereicht und führt nach Walpers und Küchenmeister (l. c. I., p. 109) unschädlich ab. Die Dosis ist bei Erwachsenen gramm. 30. Einem 10jährigen Knaben, welchem Küchenmeister gramm. 15,0 gab, gingen drei Ellen Wurm, lebend, ab und mehrere nach fünf Monaten angestellte Versuche, um Glieder abzutreiben, waren ohne Erfolg. Zürn gab das Mittel einmal mit totalem Erfolg, ein zweites Mal ohne einen solchen.

Mesenna, die Rinde von *Mesenna anthelmintica*, einer Leguminose. Nur die Rinde junger Stämme ist wirksam, die Rinde alter Stämme ist nutzlos.

Die gewöhnliche Dosis ist, nach Pruner, grmm. 22,5 und zwar wird das Mittel mit Honig zu einem steifen Brei angerührt. Küchenmeister (l. c. I., p. 110) hat es einmal angewandt, doch ohne totalen Erfolg. Vielleicht hatte das Mittel durch längeres Liegen an Wirksamkeit verloren.

Krankengeschichte.

Marie Stade, 7 Jahr alt, ist früher nie ernstlich krank gewesen. In der Nacht vom 9. auf den 10. September 1865 wurde dieselbe plötzlich, ohne dass bemerkbare Vorboten vorhergegangen waren, — so sagte wenigstens die Mutter, — von einer Parese der rechten Seite befallen, welche nach einigen Stunden wieder verschwand, aber schon am anderen Morgen 8 Uhr sich wieder einstellte. Als ich um 9 Uhr von der Klinik aus hingeschickt wurde, fand ich folgenden Status praesens vor:

Patientin ist für ihr Alter ziemlich gross, doch von zartem Körperbau. Die rechte Seite ist dem Willen gänzlich entzogen, doch ist weder eine Verziehung der Mundwinkel, noch der Zunge nachzuweisen. Ein Hervorstrecken der Zunge ist unmöglich, ebenso das Sprechen. Im Uebrigen ist die Patientin vollständig bei Besinnung. Pupillen sind gleich gross und reagiren auch auf Licht. Die Sensibilität auf der rechten Seite ist, wenn nicht ganz normal, doch nur im geringen Grade abgeschwächt. Die Untersuchung des Herzens giebt ein negatives Resultat; die Herztöne sind rein, die Herzschläge regelmässig und nicht beschleunigt, 80 in der Minute. Ebenso

ist die Respiration regelmässig. Auch die Hauttemperatur ist nicht gesteigert, 37,6. Die Untersuchung der übrigen Organe lässt gleichfalls nichts Krankhaftes auffinden. Der Stuhlgang war in den letzten Tagen regelmässig erfolgt. Es wurden nasse Umschläge auf den Kopf und eine indifferente Arznei verordnet. Am Nachmittage, 4 Uhr, als ich die Patientin wieder besuchte, war der Anfall verschwunden und fühlte sich die Patientin völlig wohl. In der folgenden Nacht stellte sich jedoch die Parese wieder ein und ich verordnete deshalb auf Anrathen des Herrn Dr. Krabler, damaligen poliklinischen Assistenten, Trochisci santonici (grmm. 0,12) Nr. 12, dreimal täglich ein Stück zu nehmen und zugleich ein Abführmittel aus Infus. Sennae compositum. Es erfolgte darauf im Laufe des Nachmittags ein Stuhl, mit welchem 5 Spulwürmer abgingen. In der folgenden Nacht und am folgenden Morgen erfolgte wieder je ein Stuhlgang, mit welchen eine grössere Menge Spulwürmer abgingen, so dass ihre Zahl sich nach oberflächlicher Zählung auf einige zwanzig belaufen mochte. Während dieser Zeit war kein Anfall von Parese eingetreten und auch am 13. und 14. stellte sich kein solcher ein, obgleich am 13. noch einige Würmer mit dem Stuhle entleert worden waren. Ich glaubte deshalb die Patientin wieder hergestellt, als sich in der Nacht vom 14. auf den 15. wiederum ein Anfall rechtsseitiger Parese ereignete. Es wurden deshalb nochmals 6 Trochisci santon. (grmm. 0,12) verordnet, worauf, nach Verbrauch von 4 Trochisci während des 15., nachdem ein Abführmittel gereicht war aus Inf. Sennae comp. nochmals eine

Anzahl Spulwürmer in zwei Stühlen entleert wurden, das erste Mal 4, das zweite Mal 6. Zur Vorsicht liess ich am folgenden Tage auch noch die beiden übrigen Trochisci nachnehmen, doch fanden sich in dem folgenden Stuhle keine Würmer vor. Seit der Zeit blieb Patientin von ihren Anfällen verschont und obgleich ich mich später mehrmals wieder nach ihr erkundigt habe, habe ich doch nie von einem neuen Anfalle gehört.

Fassen wir kurz den Verlauf der Krankheit und das Aufhören der Anfälle nach Darreichung von Santonin und Entfernung der im Darne sich befindenden Spulwürmer ins Auge, so drängt sich uns die feste Ueberzeugung auf, dass das Leiden einzig durch Wurmreiz hervorgerufen wurde. Es fand sich bei genauer, sowohl von mir, wie von Krabler vorgenommener Untersuchung der einzelnen Organe durchaus kein anderer Anhaltspunkt für die Erklärung der Zufälle, ebenso fehlte jede Temperaturerhöhung des Körpers, jede Steigerung der Puls- und Athemfrequenz. Das Eintreten eines neuen Anfalles, nachdem schon zwölf Trochisci gereicht waren und das Uebel seit fast zwei Tagen sistirt hatte, spricht nur für unsere Erklärung der halbseitigen Parese, da ja, nach abermaliger Darreichung von Santonin, wiederum Würmer, obgleich nicht gerade in grosser Anzahl entleert wurden. Der wahrscheinlich durch die ziemlich bedeutende Menge der in ihm wohnenden Parasiten erheblich gereizte Darm war noch nicht wieder zur normalen Beschaffenheit zurückgekehrt, als die noch vorhandenen Thiere auf's Neue einen Reiz hervorriefen, welcher unter solchen Umständen leicht einen frischen

Anfall zur Folge haben musste. Wie die durch Wurmreiz beobachteten Reflexerscheinungen hervorgerufen werden, warum bald leichtere, bald schwerere Störungen, in unserem Falle eine rechtsseitige Parese, zu Stande kommen, darüber ist noch nichts bekannt. Auffallend ist es, dass bei der Patientin sich gar keine Zeichen, welche die Anwesenheit von Würmern hätte vermuthen lassen, vor dem Anfalle vorfanden, dass derselbe vielmehr ganz plötzlich und unerwartet, ohne eine vorhergehende merkliche Gesundheitsstörung eintrat.